

ご使用に際して、この添付文書をよくお読みください。  
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

第2類医薬品



ゼリア新薬

かゆみ・しっしん治療薬

# 新サニアゾルD<sup>®</sup>

## 〔特 徴〕

湿疹、かぶれ等の皮膚疾患は治りにくく、はげしいかゆみや炎症を伴います。新サニアゾルDは、ゾルタイプの外用剤で、すぐれた消炎、鎮痒効果と共に、伸びがよく、速乾性で使用感のよいのが特徴です。

## ⚠ 使用上の注意

### してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります）

1. 次の部位には使用しないでください  
水痘（水ぼうそう）、みずむし・たむし等又は化膿している患部。
2. 顔面には、広範囲に使用しないでください
3. 長期連用しないでください

### 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
(1)医師の治療を受けている人。  
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。  
(3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。  
(4)患部が広範囲の人。  
(5)湿潤やただれのひどい人。
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、乾燥感、刺激感、熱感、ヒリヒリ感
皮膚（患部）	みずむし・たむし等の白癬、にきび、化膿症状、持続的な刺激感

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

## 〔効能・効果〕

湿疹、ただれ、かぶれ、じんましん、皮膚炎、かゆみ、あせも、やけど

## 〔用法・用量〕


1日数回適量を患部に塗布してください。

（必ず裏面もお読みください）

## 〈用法・用量に関する注意〉

- (1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させていただきます。
- (2)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (3)外用にのみ使用してください。
- (4)定められた用法・用量を守ってください。

## 〔チューブの穴のあけ方〕



キャップを逆さにして、突起部をチューブの先に強く押し当ててあけてください。

## 〔成分〕

成分	分量	はたらき
デキサメタゾン 酢酸エステル	0.025%	かゆみをとめ、炎症を鎮める副腎皮質ホルモン剤です。
アラントイン	0.2%	組織形成を促進します。
アミノ安息香酸 エチル	0.5%	患部の痛みやかゆみを和らげます。

添加物：クロタミトン、プロピレングリコール、カルボキシビニルポリマー、エドト酸ナトリウム水和物、pH調節剤

## 〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

ゼリア新薬工業株式会社 お客様相談室 電話 03-3661-2080  
〒103-8351 東京都中央区日本橋小舟町10-11  
受付時間 9:00~17:50 (土・日・祝日を除く)

ホームページ <http://www.zeria.co.jp>

## 副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構 <http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>  
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

サニアはゼリア新薬工業株式会社の登録商標です。



発売元  
**ゼリア新薬工業株式会社**  
東京都中央区日本橋小舟町10-11

製造販売元  
**東興薬品工業株式会社**  
富山県中新川郡立山町辻20