

目の疲れ・かゆみ・充血に
GAN 眼涼[®] RYO
 生薬由来成分配合10mL 目薬

商品の特長

テレビやパソコン、ワープロなど私たちは目の疲れやすい環境で生活しています。また、花粉やほこりによる目のアレルギー症状なども増加しています。眼涼(がんりょう)は、生薬の黄柏・黄連(ベルベリン含有)、甘草(グリチルリチン含有)に由来する成分を配合した目薬です。眼涼は、日常の目の疲れや目のかゆみなどの不快な症状をやわらげ、花粉等による目の炎症にも優れた効果を発揮します。

[使用上の注意]



相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師にご相談ください。

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (4) 次の症状のある人……はげしい目の痛み。
- (5) 次の診断を受けた人……緑内障。

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師にご相談ください。

- (1) 使用后、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

- (2) 目のかすみが改善されない場合。

- (3) 5～6日間使用しても症状がよくなる場合。

眼涼(がんりょう)は、こんなときにさしてください。

- テレビやパソコン、読書などで目が疲れたときに



- 花粉やほこりなどによる、目のかゆみ、充血に



【効能・効果】目の疲れ、結膜充血、眼病予防(水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど)、紫外線その他の光線による眼炎(雪目など)、眼瞼炎(まぶたのただれ)、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感、目のかゆみ、目のかすみ(目やにの多いときなど)

【用法・用量】1日3～6回、1回2～3滴点眼してください。

用法・用量に関連する注意

- (1) 過度に使用すると、異常なまぶしさを感じたり、かえって充血を招くことがあります。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 容器の先が、まぶたやまつ毛などに触れると、目やにや雑菌などのため、薬液が汚染又は混濁することがあるので、触れないよう目から少し離して使用してください。また、混濁したものは使用しないでください。
- (4) ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- (5) 本剤は点眼剤です。点眼の目的以外には使用しないでください。

【成分・分量】

有効成分	含量(10mL中)	はたらき
ベルベリン硫酸塩水和物(黄柏・黄连に由来する成分)	1mg	目のかゆみ、疲れ、まぶたのただれなどの症状を起こした目の各種組織の消炎・修復に有効です。
グリチルリチン酸二カリウム(甘草に由来する成分)	10mg	
アラントイン	10mg	
塩酸テトラヒドロゾリン	5mg	交感神経への作用により、結膜などの末梢血管を収縮させ、充血を緩和します。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	3mg	抗ヒスタミン剤の一つで、目のかゆみ、流涙などの症状をやわらげます。
シアノコバラミン	0.4mg	赤色のビタミンB ₁₂ で、目の調整機能をつかさどる毛様体組織に直接作用し、その機能回復を早めます。

添加物として、*ℓ*-メントール、クロロブタノール、パラベン、ホウ砂、ホウ酸を含有します。

保管及び取り扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4)他の人と共用しないでください。
- (5)使用期限を過ぎた商品は使用しないでください。また、使用期限内であっても、開封後は、できるだけ速やかに使用してください。
- (6)液色は成分の色です。液剤が衣服などに付くと着色することがあるので、付かないように十分注意してください。

《包装》10mL

本商品についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局・薬店、又は下記の「お客様相談室」までお願い申し上げます。

発売元  **久光製薬株式会社**

〒841-0017 鳥栖市田代大官町408

お客様相談室：〒100-6221 東京都千代田区丸の内1-11-1

☎0120-133250 受付時間：9:00～12:00、13:00～17:50（土・日・祝日を除く）

製造販売元 **佐賀製薬株式会社**

〒841-0201 佐賀県三養基郡基山町小倉481