

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

2008年6月改訂

歯痛剤 こんじすい  
**新今治水®**

第2類医薬品

液剤タイプの「新今治水」は、キャンフェニック処方（カンフル・フェノール・アルコールの配合）を応用してつくられた歯痛のお薬です。歯の痛いところに直接作用して、すみやかに痛みを鎮めます。

⚠ ご使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。)  
次の部位には使用しないでください。

歯ぐき、唇



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、歯科医師又は薬剤師に相談してください。

- (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人
- (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人
- (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師又は薬剤師に相談してください。

- (1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ

- (2) 5~6回使用しても症状の改善がみられない場合

効能

むし歯・浮歯・歯の根の痛みを鎮める。

用法・用量

薬剤をしみ込ませた綿球を、むし歯の穴に押し込んでください。

上部キャップを  
とります。指で清潔  
にした手で、指さ  
ない大きな  
綿球にしてお使  
いください。



付属のピンセット  
を使って綿球に適  
量の新今治水をしみ  
込ませてください。



大きな穴のあいたむし歯  
が痛むときには新今治水  
をしみ込ませた綿球を  
むし歯の穴の中へ押し  
込んでください。



小さな穴のあいたむし歯が  
痛むときには新今治水を綿  
球にしみ込ませむし歯の表  
面に塗ってください。



裏面へつづく

## 〈用法・用量に関する注意〉

- (1)定められた用法をおまもりください。
- (2)痛みのある歯の空洞以外の箇所には塗布しないでください。
- (3)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとにご使用ください。
- (4)本剤は歯科用のみに使用し、眼科用その他に使用しないでください。

- (5)本剤は歯の硬歯質(エナメル質・象牙質)を傷めませんが、歯以外のところに余分に付いた場合には一時的に食味などを変化させることがあるのでガーゼ等でふきとってください。
- (6)誤って口のまわりや顔などについた場合は、ただちに水でよく洗ってふきとってください。

※本剤は、むし歯など歯の痛みの原因を治すことはできませんので、早めに歯科医師による根本的な治療をおすすめします。

## 成分・分量(100g中)

## 作用

成分	含量	作用
チョウジ油	0.3 g	痛みを鎮めます。
フェノール	5.0 g	痛みを鎮め、殺菌します。
dl-カンフル	10.0 g	
ケイヒ油	2.5 g	痛みを鎮めます。
l-メントール	0.1 g	
ジフェンヒドラミン塩酸塩	2.0 g	炎症を抑えます。
ジブカイン塩酸塩	0.1 g	
塩酸バラブチルアミノ安息香酸ジエチルアミノエチル	0.03g	痛みを鎮めます。
サンシシチンキ	15.07g	炎症を抑えます。

添加物としてプロピレングリコール、エタノールを含有。

●合成着色剤は使用していません。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)火気に近づけないでください。
- (4)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (5)使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても開封後は品質保持の点からなるべく早く使用してください。

## 包 装

4mL

### 姉妹品

- 急な歯痛に……携帯に便利でつけやすい  
ゲル状の **コンビスイ Q**
- 痛みと発熱に…とんぶく処方ですぐれた  
効き目の **コンビスイ とんぶく**



**丹平製薬株式会社**

大阪府茨木市宿久庄2丁目7番6号  
お客様相談室フリーダイヤル(0120)500-461  
(9:00~17:00まで、土・日・祝日を除く)  
<http://www.tampei.co.jp>