


使用方法




①容器のフタをはずしてください。




②「アー」と声を出しながら頭部を押して、患部に薬液を2~3回直射してください。

※最初は薬液が出るまで4~5回押ししてください。

※薬液がノズルの先端にたまった時は、液だれを防ぐため清潔なティッシュペーパー等で拭き取ってください。



③使用後は、フタをもとの位置にはめてください。



ノズルの先端を針等で突くと薬液が出にくくなったり、折れた時大変危険です。絶対におやめください。



□腔咽喉薬 第3類医薬品

のどの炎症による つらいのどの 痛み・口内炎に のどスプレー

抗炎症成分配合

アズレンスルホン酸
ナトリウム水和物

パープルショット



30mL

第3類医薬品

パープルショット

のどの炎症によるのどあれ・
効能・効果 のどの痛み・のどのはれ・
のどの不快感・声がれ、口内炎

成分・分量 (本剤1mL中)

アズレンスルホン酸ナトリウム水和物 (水溶性アズレン)	0.2mg
--------------------------------	-------

添加物としてグリセリン、還元麦芽糖水アメ、プロピレングリコール、クエン酸、クエン酸Na、エタノール、パラベン、ℓ-メントール、pH調整剤、香料を含有する。

保管及び取り扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になり品質が変わる場合があります。)(4) 薬液が衣服等に付着すると着色します。付着した場合はすぐに水でよく洗い落としてください。(5) ノズルの先端の穴を針等で突かないでください。使用時に薬液が出にくくなる場合があります。(6) 火気に近づけないでください。(7) 使用期限を過ぎた製品は、使用しないでください。(8) 本品使用後の一定時間は、呼気中に酒気帯び運転と判定される濃度以上のアルコール濃度が検出される可能性がありますので、運転中のご使用はお控えください。

発売元:白金製薬株式会社

〒634-0803 奈良県橿原市上品寺町515

お客様相談室 TEL:0744-21-5588
受付時間9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元:ダイヤ製薬株式会社
〒634-0803 奈良県橿原市上品寺町515

副作用救済制度 ☎0120-149-931



外装フィルム:PP

開封口

第3類
医薬品

販売名:パープルショット

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

△使用上の注意

■相談すること

1. 次の人は使用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
- (2) 口内のただれがひどい人。
- (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮ふ又は口腔	発疹・発赤、かゆみ又は刺激感

(1) 症状が悪化した場合。

3. 5~6日間使用しても症状がよくなる場合場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

用法・用量

1日数回適量を患部に噴射塗布してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 定められた用法・用量を守ってください。
- (2) 息を吸いこみながら使用すると、薬液が気管支や肺に入ることがありますので、ノズルをのどの患部にむけて、軽く息をはきながら、2~3回噴射してください。
- (3) 塗布にのみ使用し、内服しないでください。
- (4) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (5) 目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐ水またはぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けてください。