

使用前にこの説明書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう保管してください。**眼科用薬**

## 目のかゆみ・結膜充血に

# ロートアルゲナード®

容量10mL

第2類医薬品

かゆみがつらい目に  
防腐剤無添加

ハード・O2  
レンズ装用中にも  
使用できます。

### 使用上の注意

#### 相談すること



1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師  
にご相談ください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 本人又は家族がアレルギー体質  
の人
- (3) 薬によりアレルギー症状を  
起こしたことがある人
- (4) 次の症状のある人…はげしい目  
の痛み
- (5) 次の診断を受けた人…縁内障

2. 次の場合は、直ちに  
使用を中止し、この説明書を持って  
医師又は薬剤師にご相談ください。

- (1) 使用後、次の症状があらわれた  
場合

関係部位	症 状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ、しみて痛い

- (2) 目のかすみが改善されない場合
- (3) 5~6日間使用しても症状がよく  
ならない場合



### 効能・効果



- 目のかゆみ
- 結膜充血
- 眼瞼炎(まぶたのただれ)
- 目のかすみ(目やにの多いときなど)

- 眼病予防(水泳のあと、ほこりや汗  
が目に入ったときなど)
- 紫外線その他の光線による眼炎(雪目など)
- 目の疲れ
- ハードコンタクトレンズを装着して  
いるときの不快感

### 用法・用量

1回1~2滴、1日3~6回点眼してください。

#### ● 用法・用量に関する注意

- (1) 過度に使用すると、異常なまぶ  
しさを感じたり、かえって充血を  
招くことがありますので用法・  
用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、  
保護者の指導監督のもとに  
使用させてください。

(3) 容器の先をまぶた、  
まつ毛に触れさせ  
ないでください。  
〔汚染や異物混入  
(目やにやホコリ等)  
の原因となる〕また、  
混濁したものは使  
用しないでください。



目やまつ毛が  
ふれることの  
ないように

- (4) ソフトコンタクトレンズを装着  
したまま使用しないでください。
- (5) 点眼用にのみご使用ください。

## 有効成分

グリチルリチン酸二カリウム  
配合量 0.25%

アレルギーの原因物質の放出を抑制し、炎症を鎮めます。

クロルフェニラミンマレイン酸塩  
配合量 0.03%

ヒスタミン（アレルギー原因物質）をブロックし、かゆみを抑えます。

塩酸テトラヒドロゾリン  
配合量 0.01%

血管を収縮させ、充血を除去します。

ビタミンB<sub>6</sub>  
配合量 0.1%

目に栄養を補給し、新陳代謝を促進します。

添加物として、ホウ酸、ホウ砂、等張化剤、l-メントール、d-カンフル、d-ボルネオール、エデト酸Na、ポリソルベート80、pH調節剤を含有します。  
※防腐剤（ベンザルコニウム塩化物、パラベン）を含んでいません。

## 保管及び取扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。品質を保持するため、自動車内や暖房器具の近くなど高温の場所(40°C以上)に放置しないでください。



(2)小児の手の届かない所に保管してください。



(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる)

(4)他の人と共用しないでください。

(5)使用期限（外箱に記載）を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても一度開封した後は、なるべく早くご使用ください。

(6)保存の状態によっては、成分の結晶が容器の先やキャップの内側につくことがあります。その場合には清潔なガーゼ等で軽くふきとってご使用ください。

(7)容器に他の物を入れて使用しないでください。

※目がかゆい時はまぶたをこすったり、刺激をくわえないようご注意ください。



## お問い合わせ先：お客さま安心サポートデスク

この商品をお使いになってのご意見・ご要望、またご不満な点などをお聞かせいただけませんか。「あなたに応えたい」サポートデスクです。

**東京:03-5442-6020 大阪:06-6758-1230**

受付時間 9:00~18:00(土、日、祝日を除く)



ロート製薬株式会社  
大阪市生野区巽西1-8-1

400522602