

服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

胃腸薬

飲みすぎ、食べすぎに

胃健錠

制酸・健胃剤

特 徴

胃酸過多、胸やけ、もたれ、飲みすぎなどの不快な症状は一刻も早く解消したいものです。

胃健錠の第一の特徴はすばやいききめです。

さらに胃を持続的に健全な状態に保ち、粘膜を被覆して刺激から保護します。

配合された生薬が胃の活性化を助けます。



使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないでください

透析療法を受けている人。

2. 長期連用しないでください

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

(1) 医師の治療を受けている人。

(2) 次の診断を受けた人。

腎臓病、甲状腺機能障害

2. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

便秘、下痢

3. 2週間位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能・効果

胃酸過多、胸やけ、胃部不快感、胃部膨満感、もたれ、胃重、胸つかえ、げっぷ、はきけ(胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき)、嘔吐、飲みすぎ、胃痛、食欲不振、食べ過ぎ

用法・用量

次の量を食後30分を目安に、水又はお湯と一緒にかまずに服用してください。

年 齢	1回量	1日服用回数
大人(15歳以上)	2錠	3回
11歳以上15歳未満	1錠	
11歳未満	服用しないでください	

<用法・用量に関する注意>

(1) 用法用量を厳守してください。

(2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成分・分量

6錠(大人1日量)中

成分	含量	はたらき
メタケイ酸アルミン酸 マグネシウム	300mg	胃内の酸度を安定させ、胃の粘膜に被膜をつくります。
合成ケイ酸アルミニウム	300mg	制酸作用に持続性があり、胃粘膜の保護作用があります。
沈降炭酸カルシウム	300mg	緩慢な制酸作用と吸着作用があります。
炭酸水素ナトリウム	1,950mg	過剰な胃酸をすばやく中和します。
センブリ末	30mg	胃部不快感・食欲不振など慢性的に衰えた胃腸機能の回復のための苦味健胃生薬です。
ゲンチアナ末	30mg	

添加物:カルメロースCa、タルク、ステアリン酸

保管および取り扱い上の注意


- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
- (5) 容器の中の詰め物は、ふたをあげた後は取り出して捨ててください(詰め物は、輸送中に錠剤が破損するのを防止するためのものです)。

現代社会はストレスを受けやすい環境になっています。
また、不規則な生活や飲みすぎなども胃酸過多を助長します。
規則的な生活、適度な運動、十分な睡眠に心がけましょう。
特に中年以降は胃腸障害を起こしやすいので、注意が必要です。

胃健錠には独特のにおいがあり、時には強く感じられることもありますが、変質などを原因とするものではありません。

お問い合わせ先

本品について何かお気づきの点がございましたら、お買い上げのお店又は、下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

 株式会社 **龍角散** [お客様相談室] 東京都千代田区東神田2-5-12
電話 03-3866-1326 時間 10:00~17:00(土・日・祝日を除く)

製造販売元

 株式会社 **龍角散**
Ryukakusan Co., Ltd.

千葉県香取郡多古町水戸字水戸台1460番地3
本社所在地: 東京都千代田区東神田2-5-12

提携

双葉製薬工業株式会社

IKN04R