

この説明書は、お薬とともに保管し、  
使用の際には、よくお読みください。

ひとみ・すこやか  
**Santen**

目の疲れ・眼病予防に 第2類医薬品



大学目薬®

テレビ・新聞・読書・細かい仕事…。目の酷使が原因で目は疲れ、さまざまな不快症状(炎症・充血)が引き起こされます。

大学目薬は、収れん作用により炎症を抑える硫酸亜鉛水和物や、かゆみをしずめるクロルフェニラミンマレイン酸塩など4つの有効成分を配合した目薬です。目の疲れや目の不快な症状の緩和にお役立てください。

### ⚠ 使用上の注意



#### 相談すること

1. 次の人は使用前に医師または薬剤師にご相談ください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 本人または家族がアレルギー体質の人
- (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (4) 次の症状のある人  
    はげしい目の痛み
- (5) 次の診断を受けた人  
    縫内障

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師または薬剤師にご相談ください。

- (1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

- (2) 目のかすみが改善されない場合

- (3) 5~6日間使用しても症状がよくならない場合

### 用法・用量

1回2~3滴、1日5~6回点眼してください。

#### ●次の注意事項をお守りください。

- (1) 過度に使用すると、異常なまぶしさを感じたり、かえって充血を招くことがあります。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 容器の先をまぶた、まつ毛に触れさせないでください。  
(目やにや雑菌などの混入のため、薬液が汚染または混濁することがあります)。また、混濁したものは使用しないでください。
- (4) ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- (5) 点眼用にのみ使用してください。



裏面につづく

## 効能・効果

目の疲れ、眼病予防(水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど)、結膜充血、目のかゆみ、紫外線その他の光線による眼炎(雪目など)、目のかすみ(目やにの多いときなど)、眼瞼炎(まぶたのただれ)、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感

## 成分・分量

成 分	分 量	はたらき
硫酸亜鉛水和物	0.1%	収れん作用により、目の炎症を抑えます。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	0.01%	ヒスタミンの動きを抑え、目の炎症・目のかゆみを抑えます。
ナファゾリン塩酸塩	0.002%	結膜(白目の部分)の充血を抑えます。
イブシロン-アミノカプロン酸	1.0%	炎症の原因となる物質の産生を抑えます。

添加物として、クロロブタノール、グラニオール、ベンザルコニウム塩化物液、ホウ酸、d-ポルネオール、I-メントール、pH調節剤を含有します。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。製品の品質を保持するため、自動車の中や暖房器具の近くなど高温となる場所に放置しないでください。また、高温となる場所に放置したものは、容器が変形して薬液が漏れたり薬液の品質が劣化しているおそれがありますので、使用しないでください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。  
(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4)他の人と共用しないでください。
- (5)使用期限をすぎた製品は使用しないでください。また、使用期限内であっても、開封後はできるだけ速やかに使用してください。
- (6)保存の状態によっては、成分の結晶が容器の点眼口周囲やキャップの内側に白くつくことがあります。その場合には清潔なガーゼで軽くふき取って使用してください。

## 包 装 15mL

〔自然環境に配慮し、携帯袋は添付しておりません。ご理解の程お願い申し上げます。〕

## お問い合わせ先

商品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。

参天製薬株式会社「お客様相談室」 電話番号 06-6321-8950  
受付時間 9:00~17:00 (土・日・祝日を除く)

製造販売元  
**参天製薬株式会社**  
大阪市東淀川区下新庄3-9-19  
www.santen.co.jp

商品およびアイケアに関する情報は <http://hitomi-sukoyaka.com>