

ご使用に際して、この添付文書をよくお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

第2類医薬品



痔の痛み・出血の緩和に

ドルマインH坐剤

(ユーカリ油・ヒドロコルチゾン酢酸エステル・リドカイン塩酸塩配合)
外用痔疾用薬

〔特 徴〕

1. 患部の炎症をおさえるヒドロコルチゾン酢酸エステル、傷の治りをたすけ組織を修復するアラントインなど7つの成分を配合した坐剤で、痔による代表的な4つの症状、痛み・出血・はれ・かゆみにすぐれた効果を発揮します。
2. 卵黄油、ユーカリ油を配合していますので、傷ついた患部を保護し、使用時に清涼感があります。
3. 挿入しやすい小さめの坐剤で、肛門内側のいぼ痔のはれ・出血等に効果的です。



⚠ 使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないでください
 - (1) 本剤又は本剤の成分、鶏卵によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (2) 患部が化膿している人。
2. 長期連用しないでください

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 授乳中の人。
 - (4) 高齢者。
 - (5) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (6) 次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、糖尿病、甲状腺機能障害
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ
その他	刺激感、化膿

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

3. 10日間位使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

〔効能・効果〕

きれ痔 (さけ痔)・いぼ痔の痛み・かゆみ・はれ・出血の緩和

〔用法・用量〕

年 齢	1 回 量	用 法
成人 (15才以上)	1 個	肛門内に挿入してください。なお、1日3回まで使用できます。
15才未満	使用しないでください。	

(必ず裏面もお読みください)

〈用法・用量に関連する注意〉


- (1) 小児には使用させないでください。
- (2) 本剤が軟らかい場合には、しばらく冷やした後に使用してください。また、硬すぎる場合には、軟らかくなった後に使用してください。
- (3) 肛門にのみ使用してください。
- (4) 定められた用法・用量を厳守してください。

－ご使用のアドバイス－


1. 坐剤の取り出し方

- ①ミシン目にそって1個分を切り離します。
- ②図のように坐剤容器（コンテナ）を剥がし、坐剤を取り出してください。

①



②



2. 挿入の仕方

坐剤の後部を指先又はガーゼなどでつまみ、肛門内にできるだけ深く挿入してください。

3. 挿入後の注意

挿入後、激しい運動をすると、坐剤が外にでることもありますので、しばらく激しい運動はさけてください。

4. 坐剤が軟らかい場合

高温下では、坐剤が軟らかくなりやすいので、坐剤容器のまま冷蔵庫に入れるか、清潔な冷たい水の中に入れて冷やし、固まった後に、坐剤容器を剥がしてからご使用ください。

〔成分〕 1個（1.4g）中

成分	分量	はたらき
リドカイン塩酸塩	60mg	局所の痛み・かゆみをしずめます。
dl-メチルエフェドリン塩酸塩	5mg	血管を収縮させ、出血をおさえます。
ヒドロコルチゾン酢酸エステル	5mg	炎症をおさえ、出血・はれ・かゆみをしずめます。
イソプロピルメチルフェノール	2mg	患部を殺菌し、傷口の悪化を防ぎます。
アラントイン	20mg	傷の治りをたすけ、組織を修復します。
卵黄油	100mg	患部を保護します。
ユーカリ油	2mg	患部に清涼感を与えます。

添加物：軽質無水ケイ酸、没食子酸プロピル、ハードファット

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所（1～30℃）に保管してください。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3) 保管する場合は、図のように坐剤の先を下に向けて外箱に入れ、マークに従って立てて保管してください。
- (4) 他の容器に入れかえないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）
- (5) 冷凍庫に入れしないでください。
- (6) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、開封後は品質保持のためになるべく早く使用してください。



本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

ゼリア新薬工業株式会社 お客様相談室 電話 03-3661-2080

〒103-8351 東京都中央区日本橋小舟町10-11

受付時間 9：00～17：50（土・日・祝日を除く）

ホームページ <http://www.zeria.co.jp>

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構 <http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

ドルマインはゼリア新薬工業株式会社の登録商標です。



発売元
ゼリア新薬工業株式会社
東京都中央区日本橋小舟町10-11



製造販売元
日新製薬株式会社
山形県天童市清池東二丁目3番1号