

2012年8月 記載要領変更に伴う改訂

第3類医薬品

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。また、必要な時読めるよう大切に保管してください。



# ハイウルソ® 顆粒

ウルソデオキシコール酸配合 消化健胃薬

## ハイウルソ顆粒は…

ウルソデオキシコール酸に、2種の消化酵素、3種の健胃生薬を配合した顆粒で、のみやすい芳香性の消化健胃薬です。胃もたれ、食べすぎ、はきけ(二日酔・悪酔のむかつき)などの不快な症状を改善します。

- ビオジアスターゼ2000、リパーゼAP6が、食物中のデンプン及びタンパク質、脂肪の消化を促します。
- 健胃生薬のケイヒ末、ウイキョウ末、ゲンチアナ末が、弱った胃腸の働きを回復させると共に、はきけ(二日酔・悪酔のむかつき)などの症状をやわらげます。
- ウルソデオキシコール酸は、肝臓に働き、胆汁の分泌を促進し(利胆作用)、消化に時間のかかる脂肪の消化を助けます。



## 使用上の注意



### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください
  - (1) 医師の治療を受けている人。
  - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 2週間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください



## 〔効 能〕

消化促進、消化不良、食欲不振(食欲減退)、食べ過ぎ(過食)、飲み過ぎ(過飲)、胃弱、胸やけ、もたれ(胃もたれ)、胸つかえ、はきけ(むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心)、嘔吐、消化不良による胃部・腹部膨満感

## 〔用法・用量〕

下記の1回服用量を、食後に服用します。

年齢	1回服用量	1日服用回数
成人(15才以上)	1包	3回
11~14才	2/3包	
8~10才	1/2包	
5~7才	1/3包	
5才未満	服用しないでください	

## 〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

## 〔成分・分量と働き〕3包中(1包1.3g)

成分	分量	働き
ウルソデオキシコール酸	60mg	肝臓に働き、胆汁の分泌を促進し(利胆作用)、脂肪の消化を助けます。
ピオジアスターゼ2000	30mg	デンプンやタンパク質の消化を助けます。(消化酵素)
リパーゼAP6	30mg	脂肪の消化を助けます。(消化酵素)
ケイヒ末	180mg	健胃生薬で、弱った胃腸の調子を整えます。
ウイキョウ末	180mg	
ゲンチアナ末	90mg	

添加物として、L-メントール、ポピドン、乳糖を含有します。

## ◎保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)
- (4) 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
- (5) 使用期限(外箱に記載)をすぎた製品は、服用しないでください。



副作用被害救済制度のお問い合わせ先  
(独)医薬品医療機器総合機構  
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>  
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めの  
お店又は下記にお願い申し上げます。  
佐藤製薬株式会社 お客様相談窓口  
電話 03(5412)7393  
受付時間: 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元  
佐藤製薬株式会社  
東京都港区元赤坂1丁目5番27号