

服用前にこの添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

漢 方 製 剤

第2類医薬品

ドルチェ顆粒

本剤は芍薬と甘草の2味からなる製剤です。芍薬は平滑筋、骨格筋の痙攣と痙攣性疼痛を緩解する作用があります。また甘草は鎮痛、緩和の作用があり、芍薬と甘草を併用すると急迫症状や攣急を緩解する効があるため、腹痛及び手足がひきつれて痛み、またその他の急激に起こった筋肉の攣急による痛み、に頓服として用いられます。

⚠ 使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

- 1. 次の人は服用しないでください。
 - (1) 生後3ヵ月未満の乳児
 - (2) 次の診断を受けた人
心臓病
- 2. 症状があるときのみの服用にとどめ、連用しないでください。



相談すること

- 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (3) 高齢者
 - (4) 次の症状のある人
むくみ
 - (5) 次の診断を受けた人
高血圧、腎臓病
- 2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1) まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。
その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)等があらわれる。
うっ血性心不全、 心室頻拍	全身のだるさ、動悸、息切れ、胸部の不快感、胸が痛む、めまい、失神等があらわれる。
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。

(2) 5～6回服用しても症状がよくなる場合

■ 効能・効果

体力に関わらず使用でき、筋肉の急激なけいれんを伴う痛みのあるものの次の諸症：
こむらがえり、筋肉のけいれん、腹痛、腰痛

■ 用法・用量

次の量を1日2～3回服用する。

年 齢	1回服用量
成人(15歳以上)	1包(2g)
7歳以上15歳未満	2/3包
4歳以上 7歳未満	1/2包
2歳以上 4歳未満	1/3包
生後3ヵ月以上2歳未満	1/4包

〈用法・用量に関連する注意〉

- 1. 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- 2. 1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させてください。

■ 成分・分量：本品3包(1包2g)中

芍薬甘草湯エキス2.4g

成 分	含 量
日局 シャクヤク	6g
日局 カンゾウ	6g

より製した乾燥エキス

添加物：乳糖、バレイショデンプン、メタケイ酸アルミン酸Mg、ヒドロキシプロピルセル
ロース、カルメロースCa、ステアリン酸Mg

■ 保管及び取り扱い上の注意

- 1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 2. 小児の手の届かない所に保管してください。
- 3. 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります)。
- 4. 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

■ お客様相談室

TEL 06-6131-1300(祝祭日を除く 月～金曜日 10:00～17:00)

製造販売元

株式会社 阪本漢法製薬
大阪市北区曽根崎2丁目7番4号
<http://www.sakampow.com>