

のんで効く「皮膚炎、皮膚のかゆみ、鼻炎」のくすり

アレルギー用薬 **小粒タウロミン**

- 11種類の生薬に加えて、栄養成分であるカルシウム、ビタミン、アミノ酸など全部で23種類の有効成分を配合し、皮膚疾患や鼻炎に効果をあらわします。
- 塗り薬では対処しきれない広範囲の皮膚炎や皮膚のかゆみも抑えます。
- 症状の程度により、服用量を調節することができます*。

*用法・用量の範囲内において

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

- ① 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください
他のアレルギー用薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(かぜ薬、鎮咳去痰薬、鼻炎用内服薬、乗物酔い薬等)
- ② 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください(眠気等があらわれることがあります。)
- ③ 長期連用しないでください



相談すること

- ① 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(4) 次の症状のある人。排尿困難
(5) 次の診断を受けた人。緑内障
- ② 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
泌尿器	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

- ③ 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください 口のかわき、眠気
- ④ 5～6日間服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

(裏面へ続く)

効能・効果

湿疹、皮膚炎、じんま疹、皮膚のかゆみ、鼻炎

用法・用量

次の量を水又は温湯で服用してください。症状により通常量の2～3倍服用することもできます。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	12錠	3回
8歳以上15歳未満	6錠	
5歳以上8歳未満	4錠	
3歳以上5歳未満	2錠	
3歳未満の幼児	✕服用しないこと	

<用法・用量に関連する注意>

- ①用法・用量を厳守してください。
- ②小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- ③3歳以上の幼児に服用させる場合には、薬剤がのどにつかえることのないよう、よく注意してください。

成分・分量(36錠中)

●サイコ末 90mg ●ハマボウフウ末 90mg ●センキュウ末 90mg ●ブクリョウ末 90mg ●オウヒ末 90mg ●キョウ末 90mg ●ショウキョウ末 90mg ●ドクカツ末 54mg ●ケイガイ末 54mg ●カンゾウ末 54mg ●リン酸水素カルシウム水和物 1080mg ●乳酸カルシウム水和物 360mg ●ヨクイニン末 360mg ●タウリン 36mg ●グルクロノラクトン 36mg ●チアミン硝化物(ビタミンB₁) 7.2mg ●リボフラビン(ビタミンB₂) 7.2mg ●ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB₆) 3.6mg ●ニコチン酸アミド 14.4mg ●パントテン酸カルシウム 14.4mg ●イノシトール 18mg ●エルゴカルシフェロール(ビタミンD₂) 9μg(360国際単位) ●クロルフェニラミンマレイン酸塩 3.6mg [添加物]デキストリン、パレイシヨデンブ、カルメロースCa、乳糖、ステアリン酸Mg、タルク

<成分・分量に関連する注意>

- ①本剤は、生薬を配合していますので、ときに錠剤表面に茶褐色の斑点を生じることがありますが、効果には変わりありません。
- ②ビタミンB₂(リボフラビン)により、尿が黄色になることがあります。

保管及び取扱い上の注意

- ①高温をさけ、直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- ②小児の手の届かない所に保管してください。
- ③他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- ④水分が錠剤につくと、内容成分の変化のもととなりますので、水滴を落としたり、ぬれた手で触れないでください。誤って錠剤をぬらした場合は、ぬれた錠剤を廃棄してください。
- ⑤ビンの中の乾燥剤は、本剤を使い終わるまで捨てないでください。また、間違って服用しないよう注意してください。
- ⑥ビンの中の詰め物(ビニール)は、輸送中に錠剤が破損するのを防止するために入れてあるもので、キャップをあけた後は、必ず捨ててください。
- ⑦ビンのキャップのしめ方が不十分な場合、湿気などにより、品質に影響を与える場合がありますので、服用のつどキャップをよくしめてください。
- ⑧使用期限(外箱及びラベルに記載)をすぎた製品は服用しないでください。

本製品に関するお問い合わせ

お買い求めのお店又は下記へお願いします。

興和株式会社 医薬事業部 お客様相談センター

TEL 03-3279-7755 FAX 03-3279-7566
受付時間：月～金(祝日を除く)9:00～17:00

●興和製品サイト <https://hc.kowa.co.jp/otc>



発売元 興和株式会社 〒103-8433 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14

製造販売元 福井製薬株式会社 〒536-0002 大阪市城東区今福東3丁目1番26号

20905231