

鎮痒消炎剤

股間・内股などのかゆみ・かぶれに

ムズメン



- 使用に際して、この添付文書を必ずお読みください **非ステロイド剤** **第2類医薬品**
また必要な時に読めるよう大切に保管してください
- 使用期限（パッケージ側面およびチューブ底に記載）を過ぎた製品は使用しない

股間・内股などのかゆみ・かぶれに

鎮痒消炎薬

ラナケイン
LANACANE® **ムズメン**®

しみないクリームタイプ **ムシる・汗の刺激・下着で擦れる**

販売名:ムズメン

- ① リドカインが、ツライかゆみを素早く鎮めます
- ② ジフェンヒドラミン塩酸塩でかゆみの発生を抑えます
- ③ トラブルの元となる雑菌の発生を抑えます
- ④ 低刺激性で肌にやさしくしみません


■■■■■ 下記のような症状にお使いいただけます ■■■■■

● **ムシや汗の刺激によるかゆみ**

股間・内股はムシで雑菌が繁殖しやすく、汗も多くかきやすいため、かゆくなります。

● **下着の擦れによるかゆみ**

股間・内股の肌は刺激に非常に敏感なので、下着との擦れによってもかゆくなります。



⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

1. 次の部位には使用しないこと 目や目のまわり、口唇



相談すること

1. 次の人は使用前に医師または薬剤師に相談すること

(1) 医師の治療を受けている人 (2) 妊婦または妊娠していると思われる人

(3) 乳幼児 (4) 本人または家族がアレルギー体質の人

(5) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人 (6) 湿潤やただれのひどい人

2. 次の場合は、使用を中止し、この文書を持って医師または薬剤師に相談すること

(1) 使用後、次の症状があらわれた場合 (2) 5～6日間使用しても症状がよくなる場合

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、はれ、かゆみ

股間・内股などのかゆみ・かぶれに

第2類医薬品

ラナケイン[®] **ムズメン**[®]
LANACANE

■ 効能・効果

かゆみ、かぶれ、湿疹、あせも、ただれ、皮ふ炎、じんましん、虫さされ、しもやけ

■ 用法・用量

1日数回、患部に適量を塗布してください

<用法・用量に関連する注意>

- (1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること
 - (2)目に入らないように注意すること 万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗うこと なお、症状が重い場合には眼科医の診療を受けること
 - (3)外用にのみ使用すること
- ※ 同じ部位に他の外用剤との併用は避けること
※ 患部やその周囲が汚れたまま使用しないこと

■ 成分・分量(100g中)


リドカイン	2.0g	かゆみを素早く鎮める
ジフェンヒドラミン塩酸塩	2.0g	かゆみの発生を止める
イソプロピルメチルフェノール	0.1g	トラブルの元となる雑菌の発生を抑える
トコフェロール酢酸エステル(ビタミンE)	0.3g	新陳代謝を高め、患部の治りを早める

添加物として、モノステアリン酸グリセリン、ポリソルベート60、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、パラベン、ステアリルアルコール、セタノール、プロピレングリコール、カルボキシビニルポリマー、セバシン酸ジエチル、トリエタノールアミンを含有する

■ 保管および取扱い上の注意

- (1)小児の手の届かないところに保管すること
- (2)直接日光の当たらない湿気の少ない涼しいところに密栓して保管すること
- (3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)

- 陰のうに起こるかゆみは、ほとんどの場合いんきんたむしが原因ではありません
- いんきんたむしは、内股の付け根で起こることが多く、赤い小さなぼつぼつができて、同心円状に広がり、激しいかゆみを伴うことがあります
- 5~6日間使用しても症状の改善が見られない場合には、いんきんたむしなどの可能性があります いんきんたむしが疑われる場合は、医師または薬剤師にご相談ください

 発売元
小林製薬株式会社
〒541-0045 大阪市中央区道修町4-3-6

— 製品のお問い合わせ先 —
お客様相談室 ☎ 06(6203)3625
受付時間 9:00~17:00 (土・日・祝日を除く)
ホームページアドレス <http://pr.kobayashi.co.jp>

製造販売元
小林製薬株式会社
〒567-0057 大阪府茨木市豊川11-30-3

MADE IN JAPAN

10086439