

使用に際して、この説明書きを必ずお読みください
使用期限を過ぎた製品は使用しないこと

販売名：アンメルツヨコヨコ
External Anti-Inflammatory / Analgesic

第3類医薬品 外用鎮痛消炎剤

特徴

とても塗りやすいタイプです

アンメルツヨコヨコは、容器の首の部分が曲がっているので、塗りににくい背中や腰の患部にでも、薬液がにじみ出るラバーキャップがピッタリと接し、スムーズに塗布することができます

どこでもむらなく適量を塗布できます

ラバーキャップより適量の薬液がにじみ出ますので、どの患部にでも必要なだけ、適量を塗布できます

塗りごこちのよい
さわやかな薬剤です

⚠ 使用上の注意

☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起りやすくなる)

次の部位には使用しないこと

- (1) 目の周囲、粘膜等
- (2) 湿疹、かぶれ、傷口

☒ 相談すること

①第一次は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

葉などによりアレルギー症状を起こしたことがある人

②使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 脊	発疹、発赤、かゆみ、はれ、痛み、熱感、ヒリヒリ感

③5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

成分・分量 100mL中

サリチル酸メチル 5000mg
メントール 5200mg
dl-カンフル 5200mg
クロルフェニラミンマレイン酸塩 100mg
チモール 700mg
ノナン酸バニリルアミド 10mg
添加物として、プロピレングリコール、エタノール、フェニルエチルアルルコールを含有する

効能・効果

肩のこり、筋肉痛、神経痛、腰痛、打撲、筋肉のはれ、リウマチ、しもやけ

用法・用量

患部に適量を塗布してください

<用法・用量に関する注意>

- (1) 小児に使用させ場合には、保護者の指導監督のもとに使用せること
- (2) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること
- (3) 外用にのみ使用すること

●塗布部位をラバーキャップ等の通気性の悪いもので覆わないこと

●皮ふの特に弱い方は、同じ所に続けて使用しないこと

●スポーツや入浴等、汗をかく前・後に使用した場合、ヒリヒリとした刺激、痛みや熱感が増すことがあります。これらの症状が強い場合は、石けんで洗い流すと緩和します



紙：箱



ラベル
ボトル
キャップ

製品のお問合せは、お買い求めのお店又はお客様相談室にお願いいたします

＼あつらいいな／をカチナにする

発売元 小林製薬株式会社
〒534-0045 大阪府中央区道修町4-4-10

小林製薬 お客様相談室

0120-5884-01

9:00~20:00(土・日・祝日を除く)

製造販売元 小林製薬株式会社
〒567-0057 大阪府茨木市豊川11-30-3



肩こり、筋肉痛

アンメルツ
ヨコヨコ

■ 保管及び取扱い上の注意 ■

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所（冷暗所）にキャップをしっかりと立てて保管すること

(2) 小児の手の届かない所に保管すること

(3) 他の容器に入れ替えないこと（誤用の原因になったり品質が変わること）

●キャップをしっかりと立てて保管すること

●キャップを落とすことがある

●プラスチック製品（眼鏡わく、くし、便座等）、化織の衣類、木材（塗料塗り家具、床等）、皮革等に液がつくと損耗したり、シミになることがあるので注意すること

火気厳禁 第二石油類 危険等級Ⅲ
エタノール含有物

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

第3類医薬品 82mL

税控除対象

MADE IN JAPAN