

鎮痒消炎剤

かゆがり肌の方のかゆみに冷感が効く

ラナケイン冷感ジェル

- ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください
- また、必要な時に読めるよう大切に保管してください
- 使用期限（パッケージ側面およびチューブ底に記載）を過ぎた製品は使用しないこと

第2類医薬品

販売名：ラナケイン G

LANACANE® G 鎮痒消炎薬



かゆがり肌はちょっとした刺激でかゆくなってしまうかゆみに敏感な肌を言います。
ラナケイン冷感ジェルは、そんなかゆがり肌の方のかゆみを
すばやく抑える冷感刺激成分（L-メントール）が4%配合されています。

製品特徴

1. 冷感刺激成分を4%配合し、塗ったそばからかゆみを冷感で抑えます
2. 抗ヒスタミン成分配合で、かゆみ、炎症をしっかり鎮めます
3. 塗りやすく、サラッとしたジェルタイプです

使用上の注意

⊗ してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる）
次の部位には使用しないこと 目の周囲、粘膜（例えば、口唇など）

Ⓜ 相談すること

- ① 次の人は使用前に医師または薬剤師に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 本人または家族がアレルギー体質の人
 - (3) 薬によりアレルギー症状（例えば発疹・発赤、かゆみなど）を起こしたことがある人
 - (4) 湿潤やただれのひどい人
 - (5) 乳幼児
- ② 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師または薬剤師に相談すること
 - (1) 使用后、次の症状があらわれた場合
 - (2) 5～6日間使用しても

関係部位	症 状	症状がよくならない場合
皮 膚	発疹・発赤、はれ、かゆみ	

効能・効果

かゆみ、かぶれ、湿疹、虫さされ、皮膚炎、じんましん、あせも、ただれ、しもやけ

用法・用量


1日数回、患部に適量を塗布してください

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 患部やその周囲が汚れたまま使用しないこと
- (2) 目に入らないように注意すること
万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けること
- (3) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること
- (4) 外用にのみ使用すること
- (5) 同じ部位に他の外用剤との併用は避けること

〈チューブの穴の開け方〉

キャップを逆さにして、突起物をチューブの先端に押しあてて、開けてください。



※チューブを強くにぎると薬剤が多量に出るので強くにぎらないこと

成分・分量（100g中）

シフェンヒドラミン ……	1.0g	（抗ヒスタミン成分）かゆみの発生を抑えます
リドカイン ……	2.0g	（局所麻酔成分）知覚神経を麻痺させ、かゆみを緩和します
Q-メントール ……	4.0g	（冷感刺激成分）冷感刺激によって知覚神経を麻痺させ、かゆみを緩和します

添加物として、尿素、カルボキシビニルポリマー、プロピレングリコール、BHT、エタノール、リン酸を含有する

保管および取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しいところに密栓して保管すること
- (2) 小児の手の届かないところに保管すること
- (3) 他の容器に入れ替えないこと（誤用の原因になったり品質が変わる）
- (4) 火気に近づけないこと（エタノール含有物）

販売元
小林製薬株式会社
〒541-0045 大阪市中央区道修町4-3-6

製品のお問い合わせ先
お客様相談室 ☎06(6203)3625
受付時間 9:00～17:00(土・日・祝日を除く)
ホームページアドレス <http://pr.kobayashi.co.jp>

製造販売元
小林製薬株式会社
〒567-0057 大阪府茨木市豊川11-30-3

MADE IN JAPAN

10085201