

歯茎の腫れ・痛み、口内炎に効く軟膏タイプの歯槽膿漏治療薬

# 生葉口内塗薬



ご使用に際し、この説明書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるように大切に保管ください。使用期限(外箱及びチューブに記載)を過ぎた製品は使用しないこと。

**生葉口内塗薬** 内容量 20g  
販売名 生葉口内塗薬 第3類医薬品  
(64C471) Gel Medicine for Pyorrhea

- ▼ 生葉口内塗薬は歯茎の腫れ・うみ・痛み・むずがゆさ、口臭など歯肉炎・歯槽膿漏における諸症状、口内炎に優れた効きめがあります。
- ▼ 生葉口内塗薬は高粘着性ジェルタイプなので、4つの有効成分が歯肉ポケット内に長く留まって効果的に作用し、優れた効きめを発揮します。
- ▼ 歯茎全体にマッサージしながら塗り込むとより効果的です。
- ▼ 歯茎にスーッとしみ込むような爽やかな使用感です。

### 使用上の注意

#### 相談すること

- 次の人は、使用前に医師、歯科医師または薬剤師に相談すること。
  - 医師または歯科医師の治療を受けている人
  - 本人または家族がアレルギー体質の人
  - 薬によりアレルギー症状やぜんそくを起こしたことがある人
- 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師または薬剤師に相談すること。
  - 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ
その他	味覚異常

(2) 5～6回使用しても症状がよくなる場合

**効能・効果** 歯肉炎・歯槽膿漏における諸症状(歯ぐきの出血・発赤・はれ・うみ・痛み・むずがゆさ、口のねばり、口臭)の緩和、口内炎

**用法・用量** 歯肉炎・歯槽膿漏：1日2回(朝・晩)ブラッシング後、適量(約0.3g)を指にのせ、歯ぐきに塗りこむ。  
口内炎：1日2～4回、適量を患部に塗布する。  
〔用法・用量に関する注意〕(1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。(2)歯科用のみ使用すること

#### 成分・分量(100g中)

有効成分	分量	働き
ヒノキチオール	0.1g	殺菌作用
セチルピリジニウム塩化物水和物	0.05g	殺菌作用
グリチルリチン酸二カリウム	0.4g	抗炎症作用
アラントイン	0.3g	組織修復作用

添加物として、エチト酸カルシウム二ナトリウム、クエン酸水和物、ポリソルベート80、ヒプロメロース、CMC-Na、ハッカ油、キシリトール、プロピレングリコール、L-メントール、緑色3号、黄色4号(タートラジン)、香料を含有する。

〈保管および取扱い上の注意〉

- 直射日光の当たらない涼しいところに密栓して保管すること
- 小児の手の届かないところに保管すること ●他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)

使用期限と製造番号は底面に記載  
副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

MADE IN JAPAN  
10086357

4つの有効成分が患部に留まってじっくり効く

抗炎症作用

- グリチルリチン酸二カリウム(甘草由来成分)

殺菌作用

- ヒノキチオール(ヒバ含有成分)
- セチルピリジニウム塩化物水和物

組織修復作用

- アラントイン

歯茎全体にマッサージしながら塗り込むとより効果的です。

小林製薬株式会社  
〒511-0045 大阪府中央区通船町4-3-6  
製品のお問い合わせ先  
お薬相談センター ☎06(6203)3625  
受付時間 9:00～17:00(土日・祝日を除く)

4 987072 074244  
製造販売元 小林製薬株式会社  
〒567-0057 大阪府茨木市豊川1-30-3

