

### 成分・分量 100mL中

サリチル酸グリコール 2500mg  
 トメントール 3000mg  
 クロルフェナミン酸塩 100mg  
 ニコチン酸ベンジルエステル 10mg  
 ノナン酸パニリルアミド 12mg  
 添加物として、プロピレングリコール、エタノール、ハアセチルしょ糖を含有する

### 効能・効果

肩こり、筋肉痛、筋肉疲労、腰痛、打撲、捻挫、関節痛

### 用法・用量

1日数回患部に適量を塗布してください

### <用法・用量に関連する注意>

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること
- (2) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること
- (3) 外用のみ使用すること
  - 塗布部位をラップフィルム等の通気性の悪いもので覆わないこと
  - 皮膚の特に弱い方は、同じ所に続けて使用しないこと
  - スボーツや入浴等、汗をかく前・後に使用した場合、ヒリヒリとした刺激、かゆみや熱感が増すことがあります。これらの症状が強い場合は、石けんで洗い流すと緩和します



製品のお問合せは、お買い求めのお店又はお客様相談室にお願いたします

発売元 **小林製薬株式会社**  
 〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10  
**小林製薬 お客様相談室**  
**0120-5884-01**  
 9:00～17:00(土・日・祝日を除く)

製造販売元 **小林製薬株式会社**  
 〒567-0057 大阪府茨木市豊川111-30-3

MADE IN JAPAN

**無臭性**



**肩こり、筋肉痛に**

**NEW**

**アンメルツ**

**ヨコヨコ<sub>A</sub>**

**鎮痛成分+血行促進成分**

サリチル酸グリコール ノナン酸パニリルアミド



**第3類医薬品**

**80mL**

**NEW**

**アンメルツ**  
**ヨコヨコ<sub>A</sub>**

**第3類医薬品**

### 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所(冷暗所)にキャップをしっかりと立てて保管すること
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること
- (3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (4) 火気に近づけないこと(エタノール含有物)
  - キャップをしっかりとめないと液が漏れることがある
  - プラスチック製品(眼鏡わく、くし、便座等)、化繊の衣類、木材(塗料塗り家具、床等)、皮革等に液がつくと損耗したり、シミになることがあるので注意すること

**火気厳禁** 第二石油類、危険等級Ⅲ  
エタノール含有物

副作用被害救済制度  
☎0120-149-931

**税 控除 対象**



使用に際して、この説明書きを必ずお読みください  
 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと

販売名：ニューアンメルツヨコヨコA  
 External Anti-Inflammatory / Analgesic

**第3類医薬品** **外用鎮痛消炎剤**

### 特徴

- ① 鎮痛消炎成分サリチル酸グリコールが患部に浸透し、肩こり、筋肉痛を治療していきます
- ② 血行促進成分ノナン酸パニリルアミドが、じんじんとした温かな実感とともに、滞った患部の血流を改善し、肩こりや筋肉痛を和らげます
- ③ ニオイが気にならない無臭性です
- ④ 手が汚れず使い易い、ヨコヨコボトルです

### ⚠ 使用上の注意

**⊗ (してはいけないこと)**

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる) 次の部位には使用しないこと  
 (1) 目の周囲、粘膜等 (2) 湿疹、かぶれ、傷口

**🗨 (相談すること)**

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること  
 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、痛み、熱感、ヒリヒリ感

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

10199107