

ご使用に際して、この添付文書をよくお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

湿疹・皮膚炎治療薬

第2類医薬品

プレバリン[®]αクール クリーム

患部で効き体内で低活性 クールタイプ

[特徴]

プレバリン[®]αクールクリームは、湿疹・皮膚炎に優れた効果を示すアンテドラッグタイプのステロイド剤です。

湿疹、皮膚炎、あせもなどの皮膚病は日常よく見られますが、かゆみや発赤が強いと、無意識のうちにかきこわしてしまい、症状をさらに悪化させてしまう場合があります。

プレバリン[®]αクールクリームは、このような炎症を抑えるステロイド剤にかゆみを効果的に抑える成分を配合したべつづきにくい、使用感のよいクリームタイプの皮膚疾患治療薬です。

清涼化剤(I-メントール)配合でクールな使用感のクリームです。

アンテドラッグとは：

皮膚表面の患部では抗炎症効果の高いステロイド剤として働き、体内に吸収されていくと分解され、作用が弱くなる薬剤です。



⚠ 使用上の注意

してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の部位には使用しないでください

- (1) 水痘(水ぼうそう)、みずむし・たむし等又は化膿している患部。
- (2) 目の周囲、粘膜(例えば、口唇等)。

2. 顔面には広範囲に使用しないでください

3. 長期連用しないでください

相談すること



1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (4) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (5) 患部が広範囲の人。
- (6) 潤滑やただれのひどい人。

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この添付文書を持って医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ
皮膚(患部)	みずむし・たむし等の白癬症、にきび、化膿症状、持続的な刺激感

- (2) 5~6日間使用しても症状がよくならない場合

〔効能・効果〕

湿疹、皮膚炎、あせも、かぶれ、かゆみ、虫さされ、じんましん


〔用法・用量〕

1日数回、適量を患部に塗布してください。

〈用法・用量に関する注意〉

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (3) 外用にのみ使用してください。
- (4) 本剤を塗布後、患部をラップフィルム等の通気性の悪いもので覆わないでください。

〔チューブの穴のあけ方〕



キャップを逆さにして、突起部をチューブの先に強く押し当ててあけてください。

〔成 分〕 100g 中

プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル 0.15 g

ビタミンE酢酸エステル 0.5 g

リドカイン 1 g

イソプロピルメチルフェノール 0.1 g

添加物として、エデト酸ナトリウム水和物、クエン酸水和物、軽質流動パラフィン、白色ワセリン、キサンタンガム、セトステアリルアルコール、ベヘニルアルコール、濃グリセリン、1,3-ブチレングリコール、セチル硫酸ナトリウム、パラオキシ安息香酸ブチル、1-メントール及びその他2成分を含有する。

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

お問い合わせ先

本剤のご使用により、変わった症状があらわれるなど、何かお気付きの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡頂きますようお願い申し上げます。

ゼリア新薬工業株式会社 お客様相談室

TEL 03-3661-2080 (ダイヤルイン)

受付時間 9:00~17:50 (土・日・祝日を除く)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

フリーダイヤル ☎ 0120-149-931

製造販売元



ゼリア新薬工業株式会社

東京都中央区日本橋小舟町10-11

