

使用に際して、この説明書きを必ずお読みください。また必要なときに読めるよう大切に保管してください。使用期限を過ぎた製品は使用しないこと

第3類医薬品

販売名:サカムケアa 液体ばんそうこう

△ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる) **次の部位には使用しないこと**
(1)ただれ、化膿している患部 (2)目や目の周囲、粘膜等
(3)大きなキズ、深いキズ、湿疹及び出血している患部

Ⓢ 相談すること 1.次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること(1)医師の治療を受けている人(2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 2.使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるため、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ

3.5~6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能・効果 さかむけ、すりきず、ひび、あかぎれ、小きりきず

用法・用量 患部を清潔にし、傷部のみに適量を塗り、そのまま静かに乾燥させてください

〈用法・用量に関連する注意〉 (1)患部やその周辺が汚れたまま使用しないこと (2)患部が汗や水でぬれている場合は水分をよく拭き取ってから使用すること (3)目に入らないように注意すること 万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けること (4)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること (5)本剤は、外用にのみ使用し、絶対に内服しないこと (6)傷に塗ったとき、一瞬しみますが乾燥するとしみなくなります (7)使用後にハケを水で洗わないこと(薬剤が水に触れるとゲル状に固まることがある)

成分・分量 100g中

成 分	分 量	はたらき
ピロキシリン	12g	被膜を作り、患部をおおう

添加物として、パルミチン酸イソプロピル、ヒマシ油、dl-カンフル、トコフェロール酢酸エステル、酢酸エチル、酢酸ブチル、ベンジルアルコール、イソプロパノールを含有する

保管及び取扱い上の注意 (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に必ず密栓して保管すること(密栓しないと薬剤が固まり使えなくなる) (2)小児の手の届かない所に保管すること (3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる) (4)火気に近づけないこと(イソプロパノール含有物) (5)誤飲(指をしゃぶる等)のおそれがある場合は使用をさけること

●急いでがしたいときは、本品を上塗りし、乾かないうちに拭き取ってください ●衣類・家具等につくと、とれにくいので、つかないように注意すること ●成分により、ハケや軸の色が変わることがありますが、品質上問題ありません

製品のお問合せは、お買い求めのお店又はお客様相談室にお願いいたします

発売元 **小林製薬株式会社** 製造販売元 **小林製薬株式会社**

T541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10 T567-0057 大阪府茨木市豊川11-30-3

小林製薬 お客様相談室

0120-5884-01 MADE IN JAPAN

9:00~17:00(土・日・祝日を除く)