

ここから
開けてください

⚠【使用上の注意】

ご使用に際し、外箱に記載の説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

してはいけないこと(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起ります)

1. 次の部位には使用しないでください
(1)水痘(水ぼうそう)、みずむし・たむし等または化膿している患部。
(2)創傷面。(3)目や目の周囲、粘膜(例えは、口唇等)。

2. 頭顔には広範囲に使用しないでください 3. 長期連用しないでください

相談すること

1. 次の人は使用前に医師または薬剤師に相談してください

- (1)医師の治療を受けている人。(2)本人または家族がアレルギー体质の人。(3)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。(4)患部が広範囲の人。(5)湿潤やただれのひどい人。

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師または薬剤師に相談してください

- (1)使用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮 ふ	発疹・発赤、かゆみ、はれ
皮ふ(患部)	みずむし・たむし等の白癬症、にきび、化膿症状、持続的な刺激感

(2)5~6日間使用しても症状がよくならない場合。

効能・効果 かゆみ、虫さされ

用法・用量 1日数回、適量を患部に塗布してください

<用法・用量に関連する注意> (1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください (2)目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください (3)本剤は外用にのみ使用し、内服しないでください (4)定められた用法を守ってください (5)薬剤塗布後の患部をラップフィルム等の通気性の悪いもので覆わないでください

成分・分量 100g中

デキサメタゾン酢酸エステル 0.025g

ジフェンヒドラミン塩酸塩 2.0g リドカイン 0.5g

de-カンフル 2.0g &-メントール 3.0g

添加物：クエン酸水和物、ヒドロキシプロピルセル

ロース、ハーセチルシロ糖、エタノール、アビシン酸

ジイソプロピル

副作用被害救済制度 0120-149-931

第2類医薬品

鎮痒消炎剤 18g

RAKOOOL

ラキピオ EX ゲル
かゆみ・虫さされ



3つのかゆみ止め成分の
トリプル効果!

デキサメタゾン酢酸エステル・ジフェンヒドラミン塩酸塩・リドカイン

RAKOOOL
ラキピオ EX ゲル
第2類医薬品 鎮痒消炎剤 18g

かゆみ
虫さされ

保管及び取り扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない温湿度の少ない涼しい所に密栓して保管してください
- (2)小児の手の届かない所に保管してください (3)他の容器に入れかえないでください(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
- (4)火気に近づけないでください (5)メガネ、時計、アクセサリーなどの金属類、化繊の衣類、プラスチック類、床や家具などの塗装面等に付着すると変質することがありますので、付着しないよう注意してください (6)使用期限(外箱及び容器に記載)を過ぎた製品は使用しないでください

発売元

ラクール薬品販売株式会社
東京都足立区鹿浜1丁目9番14号

製造販売元

東光薬品工業株式会社
東京都足立区新田2丁目16番23号

製造
番号

使用
期限

お問い合わせ先
0120-86-8998