

鎮痒消炎薬

マキロンパッチエース

【効能・効果】

虫さされによるかゆみ

第2類医薬品

使用前にこの箱の説明文
書を必ずお読み下さい。

▲使用上の注意

✕してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の部位には使用しないで下さい。(1) 水瘡(水ぼうそう)、みずむし・たむし等又は化膿している患部 (2) 目の周囲、粘膜炎 (3) 傷口、湿潤(かきこぼし)、たれ、しっしん、かぶれ
2. 顔面には、広範囲に使用しないで下さい。 3. 長期連用しないで下さい。

▲相関すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
 - (1) 医師の治療を受けている人 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (3) 薬などにアレルギー症状を起こしたことがある人 (4) 患部が広範囲の人
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性ありますので、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ
皮膚(患部)	みずむし・たむし等の白癬、にきび、化膿症状、持続的な刺激感、かぶれ、色素沈着

3. 5〜6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

(成分・分量) 本品の膏体 100g (1.25m²) 中

成分	分量	はたらき
デキサメタゾン酢酸エステル	0.025g	かゆみや炎症をおさえます。(抗炎症剤)
ジフェンヒドラミン	1.00g	かゆみをおさえます。(抗ヒスタミン剤)
イソプロピルメチルフェノール	1.00g	殺菌作用があります。(殺菌剤)
トコフェロール酢酸エステル (ビタミンE酢酸エステル)	0.50g	血行促進作用により、皮膚の新陳代謝をよくします。

添加物: アジピン酸ジイソプロピル、メタクリル酸、アクリル酸ブチルポリマー、BHT、メントール

副腎皮質ホルモン(ステロイド)のデキサメタゾン酢酸エステルを配合しています。

【使用法】 1日1〜3回患部に貼って下さい。(使用法に関連する注意) (1) 使用法を厳守して下さい。(2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させて下さい。(3) 外用にのみ使用して下さい。(4) 汗をかいた時、皮膚がぬれているときは、よくふき取ってから使用して下さい。(5) 数時間使用してかゆみがなくなれば、本剤をはがして下さい。(6) 同じ場所に長時間の使用はしないで下さい。

【保管及び取扱い上の注意】 (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。(2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。(3) 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります) (4) 品質保持のため、未使用分はアルミ袋に入れ、アルミ袋の切り口をきちんと折り曲げて保管して下さい。(5) 表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。 【包装】 24枚(直径2.0cm×24枚)

使用期限

製造番号



4 987107 620521

マキロンパッチエース

第2類
医薬品おたけやさん
おたけやさん
おたけやさんMADE IN JAPAN
副作用発生時
電話 0120-149-931124
枚入

貼る

かゆみどめ

マキロン®パッチエース

[抗炎症成分配合]

赤くはれた
虫さされのかゆみを
鎮める第2類
医薬品

第一三共ヘルスケア

(お問い合わせ先) 第一三共ヘルスケア(株) お客様相談室
電話 0120-337-336
受付時間 9:00〜17:00(土、日、祝日を除く)

https://www.daiichisankyo-hc.co.jp/

03/登録商標

販売元
第一三共ヘルスケア株式会社
〒103-8224 東京都中央区日本橋3-14-10製造販売元
救急薬品工業株式会社
富山県射水市戸坂32-7●この箱は環境にやさしい
フロンガスを使用しています。



貼るかゆみどめ

半透明
パッチ 24
枚入り

赤くはれた
虫さされ、かゆみに

マキロン®
パッチエース

第2類医薬品 殺菌剤配合

- 水につよく、ムレにくい
 - お子様のかきこわし防止
- デキサメタゾン酢酸エステル配合



第一三共ヘルスケア



販売元 第一三共ヘルスケア株式会社
〒103-8234 東京都中央区日本橋3-14-10

製造 救急薬品工業株式会社
販売元 富山県射水市戸部32-7

●この箱は環境に優しいベジタブルインキを使用しています。

H

使用前にこの箱の説明書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

使用上の注意

- ×してはいけないこと** (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
1. 次の部位には使用しないで下さい。(1) 水痘(水ぼうそう)、みずむし、たむし等又は化膿している患部 (2) 目の周囲、粘膜炎等 (3) 傷口、湿潤(かきこわし)、ただれ、しっしん、かぶれ
 2. 顔面には、広範囲に使用しないで下さい。
 3. 長期連用しないで下さい。

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。(1) 医師の治療を受けている人 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人 (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 (4) 患部が広範囲の人
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ
皮膚(患部)	みずむし、たむし等の白瘡、かき、化膿症状、持続的な刺激感、かぶれ、色素沈着

3. 5〜6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

虫さされによるかゆみに
マキロンパッチエース **鎮痒消炎薬** 第2類医薬品

(成分・分量) 本品の膏体100g(1.25m²)中

成分	分量	はたらき
デキサメタゾン酢酸エステル	0.025g	かゆみや炎症をおさえます。(抗炎症剤)
ジフェンヒドラミン	1.00g	かゆみをおさえます。(抗ヒスタミン剤)
イソプロピルメチルフェノール	1.00g	殺菌作用があります。(殺菌剤)
トコフェロール酢酸エステル(ビタミンE酢酸エステル)	0.50g	血行促進作用により、皮膚の新陳代謝をよくします。

添加物: アジピン酸ジイソプロピル、メタクリル酸・アクリル酸ブチルコポリマー、BHT、トメントール
本剤は、副腎皮質ホルモン(ステロイド)のデキサメタゾン酢酸エステルを配合しています。

- 【効能・効果】** 虫さされによるかゆみ
(使用方法) 1日1〜3回患部に貼って下さい。
(使用法に關連する注意) (1) 使用法を厳守して下さい。(2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させて下さい。(3) 外用用のみ使用して下さい。(4) 汗をかいたり、皮膚がぬれているときは、よくふき取ってから使用して下さい。(5) 数時間使用してかゆみがなくなれば、本剤をはがして下さい。(6) 同じ場所に長時間の使用はしないで下さい。

- 【保管及び取扱い上の注意】** (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。(2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。(3) 他の容器に入れ替えないで下さい。(倒用の原因になったり品質が変わります) (4) 品質保持のため、未使用分はアルミ袋に入れ、アルミ袋の切り口をきちんと折り曲げて保管して下さい。(5) 表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。

【包装】24枚(直径2.0cm×24枚)

MADE IN JAPAN

使用期限

製造番号



4 987107 606518

【作用】被毒救済制度 電話 0120-149-931

