



メンソレータム

エクシブ<sup>®</sup> EX クリーム

第2類医薬品

水虫は治せる!  
きちんと治療して  
清潔でキレイな素足へ!

水虫は一度なってしまったら治せないと思っていませんか?  
もしそうなら、それは、効果的な治療ができていなかったか、水虫菌が  
完全に死滅する前に治療をやめてしまい、再発してしまったなどの  
理由が考えられます。  
効果的な治療をしっかり続ければ、水虫はきちんと治すことができます。  
メンソレータム<sup>®</sup>エクシブ<sup>®</sup>EXクリームで正しく効果的に治療して、  
清潔な素足を目指しましょう。

清潔感あふれる  
さわやかな  
せっけんの  
香り

1 深部まで浸透  
水虫菌を破壊  
優れた殺菌力を持つ  
テルビナフィン塩酸塩が  
角質層の奥の水虫菌も破壊

5 24時間  
効果が持続  
(1日1回で効く)

エクシブの  
5つのはたらき

2 かゆみ止め成分  
トリプル配合  
3つのかゆみ止め成分が  
しつこいかゆみに効きます  
(「クロルフェニラミンマレイン酸塩」「  
クロタミトン」「リドカイン」)

3 皮めくれ・水ぶくれも  
キレイに!  
水虫による炎症にはたらく  
抗炎症成分(グリチルレチン酸)配合

4 足のニオイの元となる  
菌まで殺菌  
イソプロピルメチルフェノール

## [水虫治療のポイント]

## 1. 清潔に保つ

清潔は水虫治療の第一条件です。患部はせっけん  
でよく洗い、いつもすっきり清潔に保ちましょう。

## 2. しっかり乾燥

水虫菌は乾燥が苦手です。汗をかいたりぬれたり  
した後は、タオルで患部を拭いてしっかり乾燥  
させましょう。

## 3. 薬は患部の周囲にも塗る

水虫菌は、症状があらわれている範囲より広く  
潜んでいることが多いため、薬は患部を中心に、  
広めに塗りましょう。薬の塗布は皮フがやわらか  
くなっているお風呂上がりがおすすめです。

## 4. 根気強く治療を続ける

水虫菌はしつこい菌です。症状が治まり、治った  
かな?と思っても水虫菌は死滅していないことが  
多く、再発の原因になります。根治するためには、  
症状が治まったと思っても一、二ヶ月の間は治療  
を続けましょう。

使用前にこの説明書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう保管してください。

水虫・たむし用薬 [販売名] メンソレータムエクシブEXクリーム 第2類医薬品

## ⚠ 使用上の注意

### ⓧ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は使用しないでください。本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 次の部位には使用しないでください。

(1) 目や目の周囲、粘膜(例えば、口腔、鼻腔、膣等)、陰のう、外陰部等

(2) 湿疹 (3) 湿潤、ただれ、亀裂や外傷のひどい患部



### 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

(1) 医師の治療を受けている人 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人 (3) 乳幼児 (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 (5) 患部が顔面、又は広範囲の人 (6) 患部が化膿している人 (7) 「湿疹」か「水虫、いんきんたむし、ぜにたむし」かがはっきりしない人  
(陰のうにかゆみ・ただれ等の症状がある場合は、湿疹等他の原因による場合が多い)

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症 状
皮フ	かぶれ、刺激感、熱感、鱗屑・落屑(フケ、アカのような皮フのはがれ)、ただれ、乾燥・つっぱり感、皮フの亀裂、痛み、色素沈着、発疹・発赤*、かゆみ*、はれ*、じんましん*

\*:全身に発現することもあります。

3. 2週間位使用しても症状がよくならない場合や、本剤の使用により症状が悪化した場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

[効能] 水虫、いんきんたむし、ぜにたむし

[用法・用量] 1日1回、適量を患部に塗布してください。

〈用法・用量に関する注意〉

- (1) 定められた用法を厳守してください。
- (2) 患部やその周囲が汚れたまま使用しないでください。
- (3) 目に入らないようご注意ください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けてください。
- (4) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (5) 外用にのみ使用してください。
- (6) 本剤のついた手で目や粘膜に触れないでください。

[成分・分量] テルビナフィン塩酸塩 1.0g、イソプロピルメチルフェノール 1.0g、クロルフェニラミン

(100g中) マレイン酸塩 0.5g、クロタミトン 1.0g、リドカイン 2.0g、グリチルレチン酸 0.5g  
添加物として、ワセリン、流動パラフィン、パルミチン酸イソプロピル、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、セタノール、カルボキシビニルポリマー、水添大豆リン脂質、ステアリン酸ソルビタン、ヒドロキシエチセルロース、pH調節剤、エデト酸Na、BHT、ヒアルロン酸Na、エタノール、香料を含有する

〔保管及び取扱上の注意〕

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (4) 使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。  
なお、使用期限内であっても、一度開封した後はなるべく早くご使用ください。

お問い合わせ先: お客さま安心サポートデスク

この商品をお使いになってのご意見・ご要望、またご不満な点などを  
お聞かせいただけませんか。「あなたに応えたい」サポートデスクです。

東京:03-5442-6020 大阪:06-6758-1230

受付時間 9:00~18:00(土、日、祝日を除く)

ロート製薬株式会社

大阪市生野区巽西1-8-1

MADE IN JAPAN