

ご使用前に、必ずこの説明文書をお読みください。また、必要な時にすぐ読めるよう大切に保管してください。

鎮痒消炎薬 虫さされ・かゆみにしっかりと効きます

第②類医薬品

エコルデEX液

特 徴

- ・アンテドラッグ型抗炎症成分（プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル）、かゆみ止め成分（ジフェンヒドラミン塩酸塩）、殺菌成分（イソプロピルメチルフェノール）の3つの効果が虫さされやしつこいかゆみにしっかりと効きます。
- ・メントールとカンフル配合で、スーッとする清涼感がかゆみをすばやく鎮めます。
- ・べたつかない速乾性の液剤です。
- ・手を汚さずに塗れるスポンジノズルです。



使用上の注意



してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）

1. 次の部位には使用しないこと

- (1)水痘（水ぼうそう）、みずむし・たむし等又は化膿している患部。
- (2)創傷面、目の周囲、粘膜等。

2. 顔面には、広範囲に使用しないこと

3. 長期連用しないこと



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1)医師の治療を受けている人。
- (2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (4)患部が広範囲の人。
- (5)湿潤やただれのひどい人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ
皮膚（患部）	みずむし・たむし等の白癬、にきび、化膿症状、持続的な刺激感

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能・効果

虫さされ、かゆみ、しっしん、皮膚炎、かぶれ、じんましん、あせも

こんなときに・・・



繊維刺激のカユミ



虫さされによる
カユミ・炎症



カサカサ肌による
カユミ




下着のしめつけに
よるカユミ・かぶれ

用法・用量

1日数回、適量を患部に塗布してください。

【容器の使用方法】



- 使用に際しあらかじめ容器を上に向けて、スポンジ中央部を手の指等で押すなどして中の空気を抜いてください(暑い時期、温度の高い場所に置かれた場合又は内溶液が少なくなった場合等に、内圧が高まり液が多くでることがありますので、これを防ぐためです)。
- 使用する時は容器を下向き又は斜めにして患部に軽く押しあてて塗布してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (2)目に入らないよう注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。
- (3)外用にのみ使用すること。

成分・分量(100mL中)

成分	含量	はたらき
ブドニゾン草酸エステル酢酸エステル	0.15g	痛みやはれなどの炎症を抑えます
ジフェンヒドラミン塩酸塩	1.0g	かゆみを抑えます
l-メントール	3.5g	清涼感を与え、かゆみ・炎症を鎮めます
dl-カンフル	1.0g	清涼感を与え、炎症を鎮めます
イソプロピルメチルフェノール	0.1g	殺菌作用があります

添加物：ラウロマクロゴール、プロピレングリコール、ヒドロキシプロピルセルロース、エタノール

〈成分に関連する注意〉

本剤はアルコールを含んでいるので、塗布時にしみることがある。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して立てて保管すること。
- (2)小児の手の届かない所に保管すること。
- (3)他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4)火気に近づけないこと。
- (5)本剤のついた手で、目や粘膜に触れないこと。
- (6)キャップを開ける際に容器の縁で指を傷つけないよう十分注意すること。また、キャップは液もれを防ぐためしっかりと閉めてください。
- (7)使用期限の過ぎた製品は使用しないこと。また、開封後は使用期限内であっても、品質保持の点からなるべく速やかに使用すること。
- (8)本剤は、メガネ、時計、アクセサリ等の金属類、衣類、プラスチック類、皮製品、床や家具などの塗装面等に付着すると変質することがあるので、付着しないよう注意すること。

商品についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局又は下記までお願いいたします。

前田薬品工業株式会社 〒930-0916 富山県富山市向新庄町一丁目18番47号

お客様相談室 電話：076-451-3731(代表)AM9:00～PM5:00(土日祝日を除く)

発売元

 グロー薬品工業株式会社
大阪市中央区内淡路町1丁目3番2号

製造販売元

 前田薬品工業株式会社
富山県富山市向新庄町一丁目18番47号