

使用前にこの説明文書を必ずお読み下さい。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

## 第2類医薬品

花粉、ハウスダスト等による目のアレルギー症状に

# エージーアレルカット<sup>®</sup>im

クロモグリク酸ナトリウム配合点眼薬

### エージーアレルカットimの特徴

1. 抗アレルギー剤「クロモグリク酸ナトリウム」が、アレルギー誘発物質の放出を抑え、つらいアレルギー症状を緩和します。
2. 「クロルフェニラミンマレイン酸塩」が、アレルギー症状を起こすヒスタミンの受容体結合をブロックし、目のかゆみを抑えます。
3. 「グリチルリチン酸二カリウム」が、アレルギー反応による目の炎症をしずめます。
4. 「コンドロイチン硫酸エステルナトリウム」が、目のうるおいを保持し、角膜表面をいたわります。
5. とろみのある薬液です。



### 使用上の注意



#### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないで下さい。  
本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 点鼻薬と併用する場合には、使用後、乗物又は機械類の運転操作をしないで下さい。  
(眠気等があらわれることがあります)



#### 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
  - (1) 医師の治療を受けている人
  - (2) 減感作療法等、アレルギーの治療を受けている人
  - (3) 妊婦又は妊娠していると思われる人
  - (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
  - (5) 次の症状のある人：はげしい目の痛み
  - (6) 次の診断を受けた人：緑内障
  - (7) アレルギーによる症状か他の原因による症状かはっきりしない人  
特に次のような場合はアレルギーによるものとは断定できないため、使用前に医師に相談して下さい。
    - 片方の目だけに症状がある場合
    - 目の症状のみで、鼻には症状がみられない場合
    - 視力にも影響がある場合
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ、痛み

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

3. 次の場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
  - (1) 目のかすみが改善されない場合
  - (2) 2日間位使用しても症状がよくなる場合
4. 症状の改善がみられても2週間を超えて使用する場合は、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

## 効能・効果

花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のような目のアレルギー症状の緩和:目のかゆみ、目の充血、目のかすみ(目やにの多いときなど)、なみだ目、異物感(コロコロする感じ)

## 用法・用量

1回1～2滴、1日4～6回点眼して下さい。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守して下さい。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させて下さい。
- (3) 容器の先をまぶた、まつ毛に触れさせないで下さい。  
また、混濁したものは使用しないで下さい。
- (4) コンタクトレンズを装着したまま使用しないで下さい。
- (5) 点眼用에만使用して下さい。
- (6) 本剤はとろみのある薬液のため、点眼後、しばらく視野がぼやけることがありますので注意して下さい。

1. 使用する前に手をきれいに洗って下さい。
2. 下まぶたを軽く押し下げ、真上から1～2滴を点眼して下さい。  
その際に、容器の先がまぶた、まつ毛に直接触れないように注意して下さい。
3. 点眼した後、目を閉じて、液を目にいきわたらせて下さい。
4. 使用後は容器の先端やキャップを清潔に保ち、キャップをしっかりと閉めて下さい。



## 成分・分量

本剤は無色～微黄色澄明の点眼剤で、100mL中に次の成分を含有しています。

成分	分量	はたらき
クロモグリク酸ナトリウム	1g	アレルギー誘発物質の放出を抑え、つらいアレルギー症状を緩和します。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	0.015g	アレルギー症状を起こすヒスタミンの受容体結合をブロックし、目のかゆみを抑えます。
グリチルリチン酸二カリウム	0.125g	アレルギー反応による目の炎症をしずめます。
コンドロイチン硫酸エステルナトリウム	0.2g	目のうるおいを保持し、角膜表面をいたわります。

添加物:エデト酸Na、ホウ酸、ホウ砂、ベンザルコニウム塩化物、プロピレングリコール、ポリソルベート80、*dl*-カンフル、*d*-ボルネオール、pH調節剤、ヒプロメロース、ヒアルロン酸Na

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4) 他の人と共用しないで下さい。
- (5) 表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。また、使用期限内であっても、開封後は、速やかに使用して下さい。容器の使用期限表示(裏面上段)は、西暦、月を表示しています。
- (6) 自動車の中や暖房器具の近く等、高温(40℃以上)の所に置かないで下さい。(容器が変形することがあります)

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い致します。

第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室  
〒103-8234 東京都中央区日本橋3-14-10  
電話 0120-337-336  
受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

<https://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>

01®登録商標



製造販売元

**第一三共ヘルスケア株式会社**

Daiichi-Sankyo 東京都中央区日本橋3-14-10