

この説明書はお薬とともに保管し、服用の際にはよくお読みください。

## 赤ちゃんの便秘薬

# 和光堂 マルツエキス・スティック

赤ちゃんの便秘は、まっ赤になっていきんでも便が硬くてなかなかでない、お腹がはって苦しそうなど、見ていてとてもかわいそうなものです。

赤ちゃんが便秘かどうかの目安は、便の回数や便の量、硬さなどで見分けます。和光堂マルツエキス・スティックは、便が硬く排便が困難なときなどの便秘またはその傾向にあるときに用いると、おだやかですぐれた効き目を現します。

### ●和光堂マルツエキス・スティックの特長●

#### ◎おだやかな効き目

麦芽糖のゆるやかな発酵作用が腸の蠕動（内容物を送り出す動き）を亢進し、おだやかな排便をうながします。

#### ◎便利なスティックパック

環境が変わったりすると、便秘になることもあります。旅行や外出時でも持ち運びが便利で使いやすいスティックパックです。

### ⚠ 使用上の注意

#### ❌ してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり副作用が起こりやすくなります）

本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください。

他の瀉下薬（下剤）



#### ■ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師または薬剤師に相談してください。
  - (1) 医師の治療を受けている乳幼児
  - (2) 1カ月未満の乳児（新生児）
  - (3) 次の症状のある乳幼児  
激しい腹痛、嘔吐
2. 次の場合は服用を中止し、この説明書を持って医師または薬剤師に相談してください。  
1週間位服用しても症状がよくならない場合
3. 便通不足は、母乳不足または調製粉乳希釈方法の誤りにより起きることがありますので、このような場合には、医師または薬剤師に相談してください。
4. 次の症状があらわれることがありますので、このような症状の継続または増強が見られた場合には服用を中止し、医師または薬剤師に相談してください。

下痢

（裏面に続く）

**【効能・効果】**

乳幼児の便秘

**【成分】**

マルツエキス100%


**【用法・用量】**

1歳未満の乳児には、授乳前に50~100mLの温湯かミルクに加え、服用させます。  
また、1歳以上3歳未満の幼児には、そのままか50~100mLの温湯に加え、服用させます。


年齢	1回量	服用回数
1歳以上3歳未満	9g~15g (1包~1 $\frac{2}{3}$ 包)	1日3回を限度とする
6カ月以上1歳未満	6g~9g ( $\frac{2}{3}$ 包~1包)	
6カ月未満	3g~6g (1/3包~ $\frac{2}{3}$ 包)	

**〈用法・用量に関連する注意〉**

- (1)用法・用量をよく守ってください。
- (2)保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3)ご使用に際しては、次のようにすると便利です。



左図のようにスティックの★部分を持ち、切り取り線にそって斜めに切り取り、しぼり出すように哺乳びんまたはカップに入れてください。



例えば1/2包の場合は、左図のように半分のところを片方の手で押さえ、押さえたところよりしぼり出すようにして下さい。残りは、袋の口を輪ゴムなどでしめて保管してください。

**【保管及び取扱い上の注意】**

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)1包の分割した残りを使用する場合には、袋の口を輪ゴムなどでしめて保管し、2日以内に服用してください。
- (5)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

本品に関するお問い合わせは、お買い求めの薬局・薬店または下記までお願い致します。

**和光堂株式会社** お客様相談室

〒101-0048 東京都千代田区神田司町2-14-3

フリーダイヤル ☎ 0120-88-9283

(土・日・祝日を除く)

**【製造販売元】**

**和光堂株式会社**

東京都千代田区神田司町2-14-3