

胃腸薬

イノターゼ内服液G

第3類医薬品

イノターゼ内服液Gは、ウコンなど6種の健胃生薬と胃の運動を高める働きをもつ塩化カルニチンを配合した飲みやすく吸収の良い液剤で、飲み過ぎ、二日酔・悪酔のむかつき、胃もたれなどに効果的です。

⚠ 使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい
(1)医師の治療を受けている人。
- 2週間間服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい



成分と作用 1日量3びん(90mL)中

成分	分量	作用
塩化カルニチン	300mg	胃腸の運動を活発にする副交感神経を刺激して、胃液の分泌を増やし、消化を助けます。
ウコン流エキス	0.6mL (原生薬換算600mg)	香辛料として古くから利用されています。二日酔などで弱った胃の働きを高めます。
ゲンチアナチンキ	1.8mL (原生薬換算540mg)	特有の芳香、辛味、苦味が味覚神経などを刺激して反射的に唾液や胃液などを分泌させたり、胃に直接働きかけて消化液の分泌を促します。
ショウキョウチンキ	0.9mL (原生薬換算180mg)	
ケイヒチンキ	0.9mL (原生薬換算180mg)	
ソウジュツ流エキス	0.6mL (原生薬換算600mg)	
ニンジン流エキス	0.3mL (原生薬換算300mg)	胃腸の働きを高める生薬で、疲れた胃腸の働きを改善します。

添加物として、l-メントール、D-ソルビトール、グリセリン、ゼラチン、リン酸水素Na、バラベン、安息香酸Na、エタノールを含有します。

効能又は効果

食欲不振、胃部・腹部膨満感、消化不良、胃弱、食べ過ぎ、飲み過ぎ、胸やけ、胃もたれ、胸つかえ、はきけ（むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心）、嘔吐

用法及び用量

次の1回量を1日3回を限度として服用して下さい。服用間隔は4時間以上おいて下さい。

年 齢	成人（15才以上）	15才未満
1回量	1びん	服用しないこと

<用法及び用量に関連する注意>

- (1)用法及び用量を厳守して下さい。
- (2)本剤は生薬成分を含むため、まれに沈澱を生じることがありますが、薬効には変わりありません。よく振ってから服用して下さい。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。
- (2)小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3)他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4)使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

■お問い合わせ先

伊丹製薬株式会社 お客様相談室 TEL 0740-22-2059

受付時間：9時から16時30分まで（土、日、祝日を除く）

副作用被害救済制度

☎0120-149931



製造販売元

伊丹製薬株式会社

滋賀県高島市今津町下弘部280番地