

ご使用前に、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

せき・たん…フストールシロップ

フストールシロップは「せき」をしずめ「たん」の切れをよくします。

フストールシロップは12才以上からお年寄りまでの服用に適した甘くて飲みやすいシロップ剤です。
フストールシロップは「たん」のからむ「湿性のせき」にも有効であります。特に過剰な「空せき」に効力を発揮します。

睡眠時「せき」が出て眠れない、「せき」により体力が消耗する等、どうしても止めたい過剰な「せき」にはジドロコデインリン酸塩(咳中枢を抑制する中枢性鎮咳剤)を配合したフストールシロップが有効です。

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。)

1. 次の人は服用しないでください。
12才未満の小児
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください。
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)
3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。(眠気等があらわれることがあります。)
4. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。
5. 過量服用・長期連用しないでください。



■ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (3) 高齢者
 - (4) 薬などにより、アレルギー症状を起こしたことがある人
 - (5) 次の症状のある人
高熱、排尿困難
 - (6) 次の診断を受けた人
心臓病、高血圧、糖尿病、緑内障、甲状腺機能障害、呼吸機能障害、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満症
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
泌 尿 器	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。
呼 吸 抑 制	息切れ、息苦しさ等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
便秘、口のかわき、眠気

4. 5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

〔成分・分量〕 本品 100mL中

ジヒドロコデインリン酸塩……………50mg
dℓ-メチルエフェドリン塩酸塩……………125mg
グアヤコールスルホン酸カリウム……………450mg
クロルフェニラミンマレイン酸塩……………20mg
無水カフェイン……………200mg

添加物として、クエン酸Na、D-ソルビトール、白糖、パラベン、安息香酸Na、エタノール、プロピレングリコール、香料を含有しています。

〔効能・効果〕

せき、たん

〔用法・用量〕

下記の1回量を1日3～4回、添付の計量コップにとり服用してください。
なお、場合によっては、約4時間の間隔を置いて1日6回まで服用しても差し支えありません。

年 齢	1 回 量
成 人（15才以上）	10mL
12才以上～15才未満	6.6mL
12才未満	服用しないこと。

- (1) 本剤は劇薬に該当する成分も含まれていますので、定められた用法・用量を厳守してください。
(2) 小児に服用される場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 小児の手の届かない所に保管してください。
(2) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
(3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。）
(4) 計量コップは使用のつど、水洗いなどして常に清潔に保管してください。
(5) 使用期限の過ぎた製品は服用しないでください。

本品に関するお問い合わせ

オール薬品工業株式会社 くすり相談室
〒661-0953 兵庫県 尼崎市東園田町2丁目106番地
TEL (06) 6491-6222
電話受付時間：月～金（祝日を除く）
9：00～17：00

製造販売元  **オール薬品工業株式会社**
兵庫県尼崎市東園田町2丁目106番地