

第2類医薬品

# ゼノール<sup>®</sup>エクサム<sup>®</sup>液ゲル

手の届きにくい患部にぬれる  
ロングボディ

「手が届かない患部を無痛に」  
「お尻に優しくやさしく」  
「腰間コトとやら」


ZENOL

ZENOL

ZENOL

# ゼノール<sup>®</sup>エクサム<sup>®</sup>液ゲル

## 肩・関節の 痛み



フェルピナク  
3.0%  
配合

べたつかない  
液ゲル

販売名：ゼノールエクサム液ゲル

第2類医薬品

52mL 外用鎮痛消炎薬

ご使用に際して、このパッケージ  
に記載の説明書きをよくお読みく  
ださい。また、必要ときに読める  
ように大切に保管してください。

### 効能・効果

肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、筋肉痛、  
関節痛、打撲、捻挫(ねんざ)、腱鞘炎  
(手・手首・足首の痛みとはれ)、肘の  
痛み(テニス肘など)

### 用法・用量

1日2～4回、適量を患部に塗布して  
ください。

### 〈用法・用量に関連する注意〉

(1) スポンジ面が破れるおそれがあり  
ますので、お使いになる時は、スポンジ  
面に液が十分に浸透したことを確か  
めてから塗布してください。(2) 用法・用  
量を厳守してください。(3) 目に入ら  
ないようにご注意ください。万一、目に入  
った場合には、すぐに水又はぬるま湯で  
洗ってください。なお、症状が重い場合  
には、眼科医の診療を受けてくださ  
い。(4) 本剤は外用にのみ使用し、内  
服しないでください。(5) 本剤塗布後  
の患部を、ラップフィルム等の通気性  
の悪いものでおわないでください。

### 成分(100g中)

成分	含量
フェルピナク	3.0g
l-メントール	2.0g

添加物として、ヒドロキシプロピルセル  
ロース、ポリオキシエチレン硬化ヒマ  
シ油、香料、トリエタノールアミン、ア  
ルコールを含有します。

### 内容量

52mL

製造番号

使用期限

**使用上の注意**

**してはいけないこと**  
(守らないと現在の症状が悪化したり、  
副作用が起こりやすくなります。)

**1. 次の人は使用しないでください。**  
(1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー  
症状を起こしたことがある人 (2) ぜんそくを  
起こしたことがある人 (3) 妊婦又は妊娠して  
いると思われる人 (4) 15歳未満の小児

**2. 次の部位には使用しないでください。**  
(1) 目の周囲、粘膜等 (2) 湿疹、かぶれ、傷口 (3)  
みずむし、たむし等又は化膿している患部

**相談すること**

**1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は  
登録販売者に相談してください。**  
(1) 医師の治療を受けている人 (2) 薬などに  
よりアレルギー症状を起こしたことがある人  
**2. 使用後、次の症状があらわれた場合は  
副作用の可能性があるので、直ちに  
使用を中止し、この説明書きを持って  
医師、薬剤師又は登録販売者に相談  
してください。**

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、 ヒリヒリ感、かぶれ


**3. 1週間位使用しても症状がよくなら  
ない場合は使用を中止し、この説明  
書きを持って医師、薬剤師又は登録  
販売者に相談してください。**

**保管及び取扱い上の注意**

(1) 直射日光の当たらない涼しい所にキャ  
ップをしっかりと閉めて保管してください。  
(2) 小児の手の届かない所に保管してくだ  
さい。(3) 他の容器に入れ替えないでくだ  
さい。(誤用の原因になったり品質が変わ  
ります。)(4) 本剤を火気に近づけないでく  
ださい。また、使用済みの容器は火中に投  
じないでください。(5) 液が漏れるおそれ  
がありますので、使用後は、キャップをし  
っかり閉めてください。(6) 塗料(家具、塗装  
床、アクセサリー等)、繊維、皮革等に  
付着すると変質することがありますので、  
ご注意ください。(7) 使用期限が過ぎた製  
品は、使用しないでください。また、開封後  
は使用期限内であっても、品質保持の点  
からなるべく速やかに使用してください。

手の届きにくい肩・関節の痛みに  
ラクにぬれるロングボディ

肩甲骨などの、ぬりにくい患部に  
ラクにぬれます。



フェルピナク3.0%配合



関節など、曲面の患部  
にも簡単にぬれます。



べたつかないので、  
服がすぐに着られます。

### 容器の正しい使い方

- ① スポンジ中央をしっかりと押す
- ② スポンジが十分に濡ったことを確認
- ③ ゆっくりと患部に塗布



大鵬薬品工業株式会社  
東京都千代田区神田錦町1-27  
お客様相談室 TEL.03-3293-4509  
http://www.taiho.co.jp/

三笠製薬株式会社  
東京都練馬区豊玉北2-3-1

副作用被害救済制度  
電話 0120-149-931

登録商標

01A205

