



2010年3月作成

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

第2類医薬品



解熱鎮痛薬

ムヒのこども解熱鎮痛顆粒



販売名:ムヒのこども解熱鎮痛顆粒

ムヒのこども解熱鎮痛顆粒は、急な発熱や痛みを緩和するアセトアミノフェンを主成分とした
お子さま用の解熱鎮痛薬です。

特長

- 1才から11才未満のお子さま用として開発した解熱鎮痛薬です。
- お子さま好みの「イチゴ味」の顆粒剤です。
- 発熱時に消耗するビタミンC(アスコルビン酸)を配合しています。
- 胃にやさしい解熱鎮痛薬です。
- 保存・携帯しやすく、常備薬としても便利な個包装です。

⚠ 使用上の注意

本剤は小児用ですが、解熱鎮痛薬として定められた一般的な注意事項を記載しています。

してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないでください
 - (1) 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (2) 本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
 - (3) フェニルケトン尿症の人。(本剤はL-フェニルアラニン化合物を含有するため。)
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください
他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、鎮静薬。
3. 服用時は飲酒しないでください
4. 長期連用しないでください

相談すること



1. 次の人は服用前に医師、歯科医師又は薬剤師に相談してください
 - (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 高齢者。
 - (4) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - (5) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (6) 次の診断を受けた人。
心臓病、腎臓病、肝臓病、胃・十二指腸潰瘍
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、歯科医師又は薬剤師に相談してください
 - (1) 服用後、次の症状があらわれた場合。



関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等があらわれる
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群) 中毒性表皮壊死症 (ライエル症候群)	高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれ等の激しい症状が、全身の皮膚、口や目の粘膜にあらわれる
肝機能障害 ぜんそく	全身のだるさ、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)等があらわれる

- (2) 5~6回服用しても症状がよくなる場合。

効 能

- 1) 悪寒・発熱時の解熱
- 2) 頭痛・歯痛・抜歯後の疼痛・咽喉痛・耳痛・関節痛・神経痛・腰痛・筋肉痛・肩こり痛・打撲痛・骨折痛・ねんざ痛・月経痛(生理痛)・外傷痛の鎮痛

用法・用量

年 齢	1回量
7才以上11才未満	1包 
3才以上7才未満	2/3包 
1才以上3才未満	1/2包 
1才未満	服用しないこと

1日3回を限度とし、なるべく空腹時をさけて服用してください。服用間隔は4時間以上おいてください。

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 定められた用法・用量を守ってください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3) 2才未満の乳幼児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させてください。

成分とそのはたらき

有効成分1日量 3包(3.6g)中

成 分	分量	は た ら き
アセトアミノフェン	450mg	熱を下げ、痛みを和らげます。
アスコルビン酸(ビタミンC)	150mg	発熱時に消耗するビタミンCを補給します。
グリシン	450mg	解熱鎮痛成分による胃への負担をやわらげます。

添加物としてキシリトール、D-マンニトール、トウモロコシデンプン、ポビドン、アスパルテーム(L-フェニルアラニン化合物)、ステビア抽出精製物、軽質無水ケイ酸、三二酸化鉄、香料を含有します。

本剤に卵、牛乳由来の成分は配合されていません

保管及び取扱い上の注意

- (1) 小児の手のとどかない所に保管してください。
- (2) 高温を避け、直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 使用期限(ケース底面及び袋に記載)をすぎた製品は服用しないでください。
- (5) 1包を分割した残りは、袋の口を2度折り返して保管し、2日以内に服用してください。

お子さまの発熱時のアドバイス

- ☆できるだけ安静にして、十分な睡眠で体力を回復させてください。
- ☆水分を十分とるように心がけてください。
- ☆頭やわきの下などを冷やすことも効果的です。

お客様相談窓口：株式会社 池田模範堂 〒930-0394 富山県中新川郡上市町神田16番地
☎ 076-472-0911 (電話受付時間：月～金(祝日を除く) 9:00～17:00)

発売元  株式会社 池田模範堂
富山県中新川郡上市町神田16番地

製造販売元 **ダイト株式会社**
富山県富山市八日町326番地



©やなせたかし/フレーベル館・TMS・NTV

®登録商標