

本情報は箱に表示されております。

ご使用前に、この説明文をよくお読み下さい。  
また、必要な時に読めるように保管して下さい。

平成20年6月改訂

第2類医薬品

# イチジク浣腸 30E

## 特徴

**便秘に早く効きます。**

使用しやすいロングノズル。首が動いて曲がるソフト容器です。

## 使用上の注意

### してはいけないこと

連用しないで下さい。

(常用すると、効果が減弱し(いわゆる“なれ”が生じ)薬剤にたよりがちになります。)



## 相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師等に相談して下さい。

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。  
(流産の危険性があるので使用しないことが望ましい。)
- (3) 高齢者及び身体が極度に弱っている人。
- (4) はげしい腹痛、悪心・嘔吐、痔出血のある人。
- (5) 心臓病の診断を受けた人、腸の手術を受けた人又は排便直後の人。

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師等に相談して下さい。

- (1) 発疹等があらわれた場合。
- (2) 2～3回使用しても排便がない場合。

## その他の注意

たちくらみ、肛門部の熱感、腹痛、不快感、残便感等があらわれることがあります。

## 効能・効果

便秘

## 用法・用量

**12歳以上** 1回1個(30g)を直腸内に注入して下さい。

それで効果のみられない場合には、さらに同量をもう一度注入して下さい。

### 【用法・用量に関連する注意】

- (1) 用法・用量を厳守して下さい。

- (2) 本剤使用後は、便意が強まるまで、しばらくがまんして下さい。  
(使用後すぐに排便を試みると薬剤のみ排出され、効果がみられないことがあります。)
- (3) 12歳未満の小児には、使用させないで下さい。
- (4) 無理に挿入すると、直腸粘膜を傷つけるおそれがあるので注意して下さい。
- (5) 冬季は容器を温湯(40 位)に入れ、体温近くまで温めると快適に使用できます。
- (6) 浣腸にのみ使用して下さい。(内服しないで下さい。)

### 【イチジク浣腸の使い方】



ノズルを真上に向け、薬液を少し押し出し、先端周囲をぬらすと挿入しやすくなります。

### 成分・分量

本品 1 個(30g)中 日局グリセリン.....15.00g  
 添加物...ベンザルコニウム塩化物含有。 溶剤...精製水使用。

### 保管及び取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

【包装】 30g × 2コ入り 30g × 10コ入り

### お問い合わせ先

イチジク製薬株式会社 お客様相談室

電話番号: 03 - 3829 - 8214(直通)  
 受付時間: 9時 ~ 17時 (土、日、祝日を除く)

### 製造販売元

イチジク製薬株式会社

(日本製)

東京都墨田区東駒形4 - 16 - 6

便秘・浣腸について

詳しくは

<http://www.ichijiku.co.jp>

(独)医薬品医療機器総合機構

副作用救済制度

☎ 0120-149-931