

第2類医薬品 フェイタス Zα 温感 7枚入  
サイズ:7cm×10cm

セルフメディケーション 税控除対象 Hisamitsu 7枚入  
サイズ:7cm×10cm

# フェイタス

ジクロフェナクナトリウム 2.0%  
ℓ-メントール配合・ノニル酸ワニルアミド配合  
3トリプル鎮痛処方! Zα ジクサス

つらい 痛み に 温感



24時間 1日1回 ピッタリフィット 全方向伸縮 第2類医薬品

**特長**  
●効果め成分ジクロフェナクナトリウムを2.0%配合した、経皮鎮痛消炎テープ剤。  
●肩や首・腰・関節・筋肉など、のつらい痛みに効いた如きめをあらわします。  
●ノニル酸ワニルアミドのほたつきで心地よい温感作用をあらわします。  
●燃香性なので、就寝時や入浴中でも気になるアツクありません。  
●全方向伸縮で、肌にピッタリフィットします。

詳しい情報は  
こちらへ



7枚入 温感 Zα フェイタス 第2類医薬品 副作用低減薬製剤 0120-149-931

4 987188 123850

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。また、必要なときにすぐ読めるように大切に保管してください。

ここを押し開けてください。

包装 7枚(7cm×10cm)  
経皮鎮痛消炎テープ剤 第2類医薬品  
販売名:フェイタス®Zαジクサス®温感

### △ 使用上の注意

× してはいけないこと  
守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。

- 次の人は使用しないでください。  
(1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。(2) ぜんそくを起こしたことがある人。(3) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(4) 15歳未満の小児。
- 次の部位には使用しないでください。  
(1) 目の周囲、粘膜等。(2) 湿疹、かぶれ、傷口。(3) みずむし・たむし等又は化膿している患部。
- 本剤を使用している間は、他の外用鎮痛消炎薬を併用しないでください。
- 連続して2週間以上使用しないでください。

### ● 相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。  
(1) 医師の治療を受けている人。(2) 他の医薬品を使用している人。(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(4) テープ剤でかぶれ等を起こしたことがある人。(5) 次の診断を受けた人。消化性潰瘍、血液障害、肝臓病、腎臓病、高血圧、心臓病、インフルエンザ(6) 次の医薬品の投与を受けている人。ニューキノロン系抗菌剤、トリウムテレノ、リチウム、メトトレキサート、非ステロイド性消炎鎮痛剤、ステロイド剤、利尿剤、シクロスポリン、選択的セロトニン再取り込み阻害剤(7) 高齢者。
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、痛み、ヒリヒリ感、皮膚のあれ、刺激感、色素沈着、水疱、落屑(皮膚片の細かい脱落)

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診察を受けてください。

症状の名称	症状
ショック(アナフィラキシー)	使用后すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれます。
接触皮膚炎 光線過敏症	貼付部に強いかゆみを伴う発疹・発赤、はれ、刺激感、水疱・ただれ等の激しい皮膚炎症状や色素沈着、白斑があらわれ、中には発疹・発赤、かゆみ等の症状が全身に広がる場合があります。また日光が当たった部位に症状があらわれたり、悪化することがあります。

- 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

▼本商品についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局・薬店、又は下記の「お客様相談室」までお願い申し上げます。  
製造販売元 **久光製薬株式会社** お客様相談室: 0120-133250  
1BA95A 〒841-0017 鳥栖市田代大宮町408番地 受付時間/9:00-17:50(土日・祝日・会社休日を除く)

### 効能・効果

腰痛、筋肉痛、肩こりに伴う肩の痛み、関節痛、腱鞘炎(手・手指の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、ねんざ

### 用法・用量

プラスチックフィルムをはがし、1日1回1～2枚を患部に貼付してください。ただし、1回あたり2枚を超えて使用しないでください。なお、本成分を含む他の外用剤を併用しないでください。

### (用法・用量に関連する注意)

- 15歳未満の小児に使用させないでください。(2) 用法・用量を厳守してください。(3) 本剤は、痛みやはれ等の原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤なので、症状がある場合だけ使用してください。(4) 貼った患部をコタツや電気毛布等で温めないでください。(5) 強い刺激を感じることがありますので、入浴の1時間前には本剤をはがしてください。また、入浴後は30分くらいしてから使用してください。(6) 皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1～2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。(7) 皮膚の弱い人は、同じところに続けて使用しないでください。(8) 1回あたり、24時間を超過して貼り続けしないでください。さらに、同じ患部に貼りかえる場合は、その貼付部に発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きていないことを確かめてから使用してください。(9) 同じ部位に他の外用剤を併用しないでください。(10) 汗をかいたり、患部がぬれている時は、よく拭き取ってから使用してください。

### 成分・分量 (膏体100g中)

ジクロフェナクナトリウム…2.0g  
ℓ-メントール……………3.5g  
ノニル酸ワニルアミド…0.01g

添加物として、ステレン・イソブレン・スチレンブロック共重合体、テルペン樹脂、BHT、ポリソフチレン、流動パラフィン、その他2成分を含有します。

### 保管及び取扱上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります)。(4) 使用期限を過ぎた商品は使用しないでください。(5) 未使用分は袋に入れ、開口部を折りまげきちんと閉めて保管してください。