

鎮痛消炎プラスター剤  
**パスタム<sup>®</sup>FX7-L**

第2類医薬品

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。また、必要ときに読めるよう大切に保管してください。

**【特長】**

●フェルピナクを1枚あたり70mg配合した鎮痛消炎プラスター剤です。●フェルピナクは痛みに関係する物質(プロスタグランジン)の生成を抑え、肩・腰・関節・筋肉の痛みにすぐれた効き目をあらわします。●腰など広い部位に適したワイドサイズです。●微香性で、人前でも気になりません。●基布はベージュ色で伸縮性にすぐれ、お肌によくフィットします。●ライナーが3ピース(中央剥離方式)なので、はりやすい。

**⚠️【使用上の注意】**

**❌【してはいけないこと】**

[守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる]

1. 次の人は使用しないでください。

- (1) 今までに本剤によるアレルギー症状(例えば発疹、発赤、かゆみ、かぶれなど)を起こしたことがある人。
- (2) ぜんそくを起こしたことがある人。(3) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(4) 15歳未満の小児。

2. 次の部位には使用しないでください。

- (1) 目の周囲、粘膜など。(2) 湿疹、かぶれ、傷口。(3) みずむしたむし等又は化膿している患部。

3. 連続して2週間以上使用しないでください。

**🗨️【相談すること】**

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人。(2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。(3) 今までに薬や化粧品などによるアレルギー症状(例えば発疹、発赤、かゆみ、かぶれなど)を起こしたことがある人。

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師又は薬剤師に相談してください。

(1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮膚	発疹、発赤、はれ、かゆみ、ヒリヒリ感、かぶれ、水疱

(2) 5~6日間使用しても症状の改善がみられない場合

**【効能・効果】** 腰痛、肩こりに伴う肩の痛み、関節痛、筋肉痛、腱鞘炎(手・手首・足首の痛みと腫れ)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫

**【用法・用量】** 表面のライナーをはがし、1日2回を限度として患部に貼付する。

**【成分・分量】** 膏体100g中 [1枚あたり(10cm×14cm) 膏体質量2g]

フェルピナク……………3.5g

添加物として、L-メントール、流動パラフィン、スチレン・イソブレン・スチレンブロック共重合体、

その他4成分を含有します。

**【保管及び取扱い上の注意】**

- 直射日光や高温をさけ、なるべく湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 小児の手のとどかない所に保管してください。
- 誤用をさけ、品質を保证するため、他の容器に入れかえないでください。
- 品質保持のため、未使用分は袋に入れて開口部を折りまげ、きちんと閉めて保管してください。
- 使用期限(この箱及び薬袋に記載)をすぎた製品は使用しないでください。

**【包装】** (10cm×14cm)

製造販売元

**祐徳薬品工業株式会社**

佐賀県鹿島市大字納富分2596番地1  
 [お客様相談窓口] TEL.0954-63-1320  
 受付時間9:00~17:00(土、日、祝日は除く)

**3**

角をそれぞれの切り込みに差し込んでください。



**2** やまおひ

貼り方を動画でご覧いただけます。



<http://www.harimashow.jp>

**腰貼り  
お手伝いシート**

**1** 黄色い線にそってここから切りとってください。

※使い方は箱の内側に記載しています。

副作用被害救済制度の問合せ先  
 (独)医薬品医療機器総合機構  
<http://www.pmda.go.jp/>  
 ☎0120-149-931

第2類医薬品 **パスタム<sup>®</sup>FX7-L**