

この箱はお薬とともに保管し、
ご使用の際にはよくお読みください。

健栄きず薬

第3類医薬品

▲使用上の注意

してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人は使用しないこと。

相談すること ① 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。(1) 医師の治療を受けている人。(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(3) 患部が広範囲の人。(4) 深い傷やひどいやけどの人。② 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。皮膚：発疹・発赤、かゆみ。まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

| 症状の名称 | 症状 |
|----------------|---|
| ショック(アナフィラキシー) | 使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。 |

③ 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

成分・分量 1mL中ポビドンヨード 100mg(有効ヨウ素として10mg)

●添加物：グリセリン、クエン酸、リン酸水素2Na、ラウロマクロゴール、pH調整剤

効能・効果 ●きり傷、さし傷、すりむき傷、靴ずれ、やけど等の患部の殺菌・消毒 ●とびひ、おでき等の感染皮膚面の殺菌・消毒

用法・用量 1日数回患部に塗布する。**【用法・用量に関連する注意】**(1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。(2) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。(3) **本剤は外用だけに使用し、内服、うがいや粘膜の殺菌・消毒には使用しないこと。**(4) 石けん等との併用は本剤の殺菌・消毒作用を弱めることがあるので石けん分を洗い落としてから使用すること。(5) 定められた用法、用量を厳守すること。

保管及び取扱い上の注意 (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。(2) 小児の手の届かない所に保管すること。(3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わることがある) (4) 衣服等に付着した場合は、水で洗い落とすこと。(5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。



健栄製薬株式会社
大阪市中央区伏見町2丁目5番8号

第3類医薬品



健栄製薬

開け口

殺菌
消毒

健栄
きず薬



©meiji ad

殺菌・消毒に
とびひ・おできの
きりきず・すりきず、

とびひ・おできの
殺菌・消毒に

殺菌
消毒

健栄
きず薬



©meiji ad

外用だけに使用し、
内服やうがいには
使用しないでください。



©meiji ad

上手なキズのお手当

1. お手当の前に石けんで手をよく洗いましょう。
2. きず口に泥や砂などの異物があれば流水で洗い流しましょう。
3. 清潔な綿綿などに本剤を十分にしみこませ、中心部より外に向かって広めに塗布し、そのまま乾かしてください。

※救急バンなどできず口を保護する場合は、本剤が乾いてからおおってください。

健栄製薬(株)

お問い合わせ先

電話番号 (06) 6231-5822

受付時間 9:00～17:00

(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度

電話:0120-149-931

第3類医薬品

30mL

製造番号・使用期限は
容器正面に記載