

【成分・分量】1g中
ジクロフェナクナトリウム…10mg
L-メントール…30mg
添加物:ヒドロキシプロピルセル
ロース、エタノール、プロピ
レンジリコール、その他2成分

【保管及び取扱い上の注意】
(1)直射日光の当たらない涼
しい所に密栓して保管してく
ださい。(2)小児の手の届か
ない所に保管してください。
(3)火気に近づけないでくだ
さい。(4)メガネ、時計、アプ
セサリー等の金属類、化粧
の衣類、プラスチック類、床や家
具などの塗装面等に付着す
ると変質することがあります
ので、付着しないよう注意し
てください。(5)他の容器に入れ
かえないでください。(誤用
の原因になったり品質が変
わる場合があります)(6)使用
期限を過ぎた製品は使用し
ないでください。なお、使用
期限内であっても、開封後
はなるべく速やかに使用し
てください。

発売元
ラクール薬品販売株式会社
東京都足立区鹿浜1丁目9番14号

◆お問い合わせ先◆
フリーダイヤル 0120-86-8998

製造販売元
東光薬品工業株式会社
東京都足立区新田2丁目16番23号

RAKOOL

第2類医薬品

ジクロフェナクNa1%
+L-メントール (税控除対象)

ラクール 経皮鎮痛消炎剤
ラクペタン[®]DX
液α 大容量110mL

肩、腰、筋肉の

痛みには!

爽快クールタイプ

広範囲に塗りやすい 液剤



【効能・効果】

関節痛、肩こりに伴う肩の痛み、
腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の
痛み(テニス肘など)、筋肉痛、
腰痛、打撲、捻挫

【用法・用量】

・1日3~4回適量を患部に塗布
してください。ただし、塗布部
位をラップフィルム等の通気
性の悪いもので覆わないで
ください。なお、本成分を含む
他の外用剤を併用しないで
ください。

・15歳未満の小児は使用し
ないでください。

(用法・用量に関連する注意)

(1)定められた用法・用量を
お守りください。(2)本剤は、
痛みやほれ等の原因になっ
ている病気を治療するの
ではなく、痛みやほれ等の
症状のみを治療する薬
剤ですので、症状がある
場合だけ使用してください。
(3)本剤は外用にのみ使
用し、内服しないでください。

(4)1週間あたり50mLを超
えて使用しないでください。
(5)目に入らないよう注
意してください。

(6)使用部位に他の
外用剤を併用しないで
ください。(7)通気性の
悪いもの(ラップフィル
ム、矯正ベルト等)で
使用部位を覆い、密封
状態にしないでくだ
さい。(8)塗布前に
スポンジ面を患部に
押し当て、薬剤が
スポンジ面に浸透し
ていることを確認し
てください。(9)ス
ポンジが乾いたま
ま塗布するとス
ポンジが破れるお
それがあります)

(10)火気厳禁 第一石油類 水溶性
危険等級II(エタノール)

副作用被害救済制度
電話 0120-149-931

こちら
開けてください

この説明文書は、ご使用前に必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう保管してください。

【使用上の注意】

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないでください
(1)本剤または本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。(2)ぜんそくを起こしたことがある人。(3)妊婦または妊娠していると思われる人。(4)15歳未満の小児。
2. 次の部位には使用しないでください
(1)目の周囲、粘膜等。(2)皮膚の弱い部位(顔、顔わきの下等)。(3)湿疹、かぶれ、傷口。(4)みずむしといったむし等または化膿している患部。
3. 本剤を使用している間は、他の外用鎮痛消炎剤を併用しないでください
4. 長期連用しないでください

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください
(1)医師の治療を受けている人。(2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(3)次の医薬品の投与を受けている人。ニューキノロン系抗菌薬
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、痛み、刺激感、熱感、皮ふのあれ、落屑(フケ、アカのような皮ふのはがれ)、水疱、色素沈着

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診察を受けてください

症状の名称	症状
ショック(アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮ふのかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれます。
接触皮膚炎、光線過敏症	塗布部に強いかゆみを伴う発疹・発赤、はれ、刺激感、水疱・ただれ等の激しい皮膚炎症状や色素沈着、白班があらわれ、中には発疹・発赤、かゆみ等の症状が全身に広がる場合があります。また、日光が当たった部位に症状があらわれたり、悪化する場合があります。

3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

製造
番号

使用
期限