
ご使用に際して、外箱の説明文
を必ずお読みください。

また、必要な時に読めるよう大
切に保存してください。

日本薬局方 加香ヒマシ油

〔使用上の注意〕

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、
副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は服用しないこと

(1) はげしい腹痛又は悪心・嘔吐のある
人。

(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。

(3) 3歳未満の乳幼児。

(4) 防虫剤(ナフタリン等)、殺そ剤(猫
イラズ等)等の薬剤を誤って服用し
た人。(このような場合は、直ちに
医師の治療を受けること。)

2. 本剤を服用している間は、次のいず れの医薬品も服用しないこと

駆虫薬、他の瀉下薬(下剤)

3. 授乳中の人は本剤を服用しないか、 本剤を服用する場合は授乳を避ける こと

4. 連用しないこと

*〔使用上の注意〕のつづき

相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること

医師の治療を受けている人。

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この外箱を持って医師又は薬剤師に相談すること

服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	はげしい腹痛、悪心・嘔吐

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること

下痢

〔効能効果〕

腸内容物の急速な排除（食あたり等）

〔用法用量〕

本剤は、下記用量を1日1回を限度として、必要時、そのまま又は水、牛乳などに浮かべて服用する。

大人（15歳以上） 20 mL

11歳以上15歳未満 13 mL

7歳以上11歳未満 10 mL

3歳以上 7歳未満 6 mL

***〔用法用量〕のつづき**

〈用法用量に関連する注意〉

- (1)用法用量を厳守すること。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
- (3)就寝前の服用を避けること。

〔成分分量〕 1 mL中

ヒマシ油 0.99 mL含有

添加物：オレンジ油、ハッカ油

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2)小児の手の届かない所に保管すること。
- (3)他の容器に入れ替えないこと。
(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4)火気に近づけないこと。
- (5)使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。

(添付のコップは 10 mLです。)