

この説明書は、使用前によくお読みください。
 なお、使用が終わるまで大切に保管してください。

第2類医薬品

いぼ・うおの目・たこに 強力イボチョン

強力イボチョンは、皮ふの角質を軟化し、腐蝕させて、いぼ、うおの目、たこをとる薬です。患部に塗ってしばらくすると、白いうすい膜が張ってきます。この時、有効成分が徐々に浸透し、時間とともに角質を軟化して効力を発揮するよう工夫されています。

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

1. 次の部位には使用しないでください

- (1) 顔面、特に目や目の周囲、粘膜（例えば、口腔、鼻腔、膣等）、やわらかい皮ふ面（首の回り、胸部、わきの下、うでの内側等）、陰のう、外陰部等。
- (2) 湿疹。
- (3) 湿潤、ただれ、亀裂や外傷のひどい患部。
- (4) ロウ様光沢があり、押すと白いものが出てくるスイボ、お年寄りにできやすい黒褐色の扁平イボ、群生したイボ。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 乳幼児。
- (3) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (4) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 次の場合は直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、刺激感

- (2) 1週間位使用しても症状がよくなりません

【効能・効果】

いぼ、うおの目、たこ

【用法・用量】

1日1～2回添付の棒にて適量を患部に塗布してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けてください。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3)外用にのみ使用し、内服しないでください。
- (4)本剤が患部の周りの皮ふにつかないよう、よく注意して使用してください。もし、ついた場合、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、刺激感が発生することがありますので、すぐにふきとってください。
- (5)いぼ、うおの目、たこがたくさんある場合は、1～2個ずつ塗布してください。

☆塗った後は白い膜がゆっくり張ってきますので、靴下などは乾いてからはいてください。

☆次に塗るときは白い膜をそっとはがしてから塗ってください。

☆はがしにくい時は、重ね塗りができますので、無理をしないでその上から塗ってください。

☆入浴するときは、塗ったままでかまいません。

☆風呂あがりや、蒸しタオルで患部をやわらかくした後、塗布すると効果的です。

【成分・分量と作用】 100mL中

成分	分量	作用
乳酸	10.0g	角質を腐蝕させ軟化します。
サリチル酸	10.0g	角質を軟化します。
ジブカイン塩酸塩	0.5g	局所麻酔作用があり、うおの目の痛みをやわらげます。

添加物として、ヒマシ油、ピロキシリン、エーテル、エタノールを含有します。

【保管および取扱上の注意】

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)誤用をさけ品質を保持するため、他の容器に入れ替えないでください。
- (4)使用期限をすぎた製品は使用しないでください。
- (5)火気に近づけないでください。

本剤をご使用になられて、何かお気付きの点がございましたら、下記までご連絡頂きますようお願い致します。

福地製薬株式会社

T E L 0748-52-2323

受付時間 9時から17時まで(土、日、祝日を除く)

製造販売元

福地製薬株式会社

滋賀県蒲生郡日野町寺尻824