

ご使用前に必ずこの添付文書をお読み下さい。また、必要なときに読めるよう大切に保管して下さい。

顔とからだの(毛)の生育に塗って効く育毛剤

ミクロゲン・パスタ

MICROGEN PASTAE

第1類医薬品

ミクロゲン・パスタは、二種のテストステロン（男性ホルモン）を主成分とした、吸収されやすいクリーム状の外用育毛剤で、まゆ毛、ヒゲ、胸毛、腋毛、性毛など、頭髪以外の部分に生えるべき硬毛の生育促進に、塗って効果があらわすものです。

頭髪には使用できません

⚠ 使用上の注意

☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

1. 次の人は使用しないこと

- (1)本剤の成分に対しアレルギー症状を起こしたことがある人
- (2)ご使用前に本剤をチューブから5mm程度出し、内股などの皮膚のうすい所にすり込んで、翌日中に薬疹、発赤、かゆみ、かぶれ、はれなどの症状が現れた人
- (3)アンドロゲン依存性腫瘍（例えば前立腺腫瘍、乳腫瘍（悪性））及びその疑いのある人
- (4)妊婦、妊娠している可能性のある女性、授乳中の人は
- (5)小児（15歳未満）
- (6)排尿困難を伴う前立腺肥大のある人
- (7)前立腺検査※の結果、前立腺特異抗原（PSA）の値が2.0 ng/mL以上の人（医師の判断に従うこと）
※本剤の有効成分（メチルテストステロン、テストステロンプロピオン酸エステル）は前立腺腫瘍を進行させるおそれがあります。
- a)特に50歳以上の男性は前立腺腫瘍の罹患率が高まるため、本剤のご使用前に前立腺検査を受ける必要があります。
- b)継続的にご使用の人は定期的な検査を受ける必要があります。
- c)検査の結果、異常があった場合には直ちに本剤のご使用を中止して、医師又は薬剤師に相談すること
- (8)睡眠時無呼吸症候群である人
- (9)円形脱毛症の人

2. 次の部位には使用しないこと

- (1)目や目の周囲、粘膜（口腔、鼻腔等）
- (2)頭髪、マツ毛
- (3)陰茎部先端（尿道口）、恥部の粘膜部
- (4)外傷、炎症、湿疹、ただれ、化膿などのある部位

3. 本剤を使用している間は、男性ホルモンを含んだいずれの医薬品も使用しないこと

4. 使用者以外へ付着させないこと

- (1)ご使用後は石鹼とぬるま湯で手を十分に洗って下さい。
- (2)本剤を使用者以外の人に付着させないように注意して下さい。
付着した場合は直ちに洗い流して下さい。
- (3)塗布部が他の人と接触する可能性があるときは、塗布部を石鹼とぬるま湯で十分に洗い流して下さい。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師または薬剤師に相談すること

- (1)医師の治療を受けている人
- (2)前立腺肥大症ではあるが、排尿困難を伴わない人
- (3)薬や化粧品等によるアレルギー症状（発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ等）を起こしたことがある人
- (4)本人又は家族がアレルギー体质の人
- (5)重度の心臓病、腎臓病、肝臓病、高血圧又はその既往歴のある人

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること

(1)使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膜（塗った所）	発疹・発赤、はれ、かぶれ、かゆみ、水疱、にきび

- (2)1~3ヵ月使用しても症状の改善がみられない場合
- (3)月経異常、或いは変声等の男性化の兆候が見られた場合
- (4)誤った使い方をしてしまった場合

裏面に続きます

効能 男女両性の無毛症、貧毛症
(顔面、胸部、四肢、腋窩、恥部の発毛促進と育毛)

用法・用量 1日1~2回、1回0.1g~0.3gを目的の部位に塗擦する。

詳しいご使用方法

チューブの蓋を取り、その突起でチューブの口を開けて、塗布面積の大小に従い下記のように適量を塗擦します。

- ◆まゆ毛には1回0.1gくらい（小豆粒くらい）を1日1~2回、まゆがしらの方から、まゆじりの方へ軽くスリ込んでください。
- ◆体毛（性毛）の無毛や薄毛には、1回0.1g~0.3gを1日1~2回、粘膜の部分につけないように注意して、下腹部へスリ込んでください。
- ◆ヒゲ、胸毛などには、塗布部分の広さに応じて、1回0.1g~0.3gをよく指先でのばすように塗擦し、1日1~2回ずつ使用してください。
- ◆使いすぎないようご注意ください。

用法・用量に関する注意

- (1)定められた用法・用量を厳守してください。
- (2)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (3)ご使用前後には、手指をよく洗ってください。
- (4)塗布部を清潔にしてからお使いください。
- (5)外用にのみ使用してください。
- (6)ミクロゲン・バスタは即効性ではなく、一般的には1ヵ月から2~3ヵ月くらいの連続使用が必要とされています。しかし、効果には個人差があるので、1~2ヵ月続けて使用しても反応が認められないような場合には、期待するような効果を得られることも考えられますので、それ以上のご使用はおすすめできません。
- (7)高齢者（65才以上）のご使用は効果が期待できない場合もあります。
- (8)白毛が黒毛になる効果はございません。

成分・分量

本剤1g中

有効成分	含量
メチルテストステロン	10mg
テストステロンプロピオン酸エステル	5mg

添加物としてステアリルアルコール、プロピレングリコール、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ステアリン酸グリセリン、パラベン、ワセリン、コレステロール、感光素301号、香料を含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光を避け、なるべく湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり、品質が変わることがあります）
- (4)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。
- (5)本剤が出すぎた場合は、チューブに戻さないでください。
- (6)本剤をチューブから出しにくい場合は、手のひら等で1~2分温めてください。

…お問い合わせ先…

啓芳堂製薬株式会社 お客様相談室

☎03-3828-5663 受付時間 9:00~17:00 (土、日、祝日を除く)

—製造販売元—

啓芳堂製薬株式会社

東京都文京区千駄木1-22-3

☎03-3821-0085(代)