

2008年10月作成

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

かゆみを伴う乾燥肌治療薬

カユピタック[®]ローション 20 KAYUPITAC LOTION20

第2類医薬品

特徴

保湿成分の尿素 20%に、かゆみ止め成分リドカイン（局所麻酔剤）・ジフェンヒドラミン（抗ヒスタミン剤）を配合したローション剤で、かゆみを伴う乾燥性皮膚治療薬です。

- 尿素のはたらきで、カサカサ肌にうるおいを与え、しっとりなめらかな状態を保ちます。
- リドカイン、ジフェンヒドラミンが不快なかゆみをしずめ、グリチルレチン酸が炎症をおさえます。
- 乳液状で広範囲に塗りやすく、液だれしません。
- 無臭性なので、においが気になりません。

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

〔守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。〕

1. 次の人は使用しないでください。
 - (1) 本剤による過敏症状（発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等）を起こしたことがある人
2. 次の部位には使用しないでください。
 - (1) 目のまわり、粘膜等
 - (2) 引っかき傷等のきずぐち、亀裂（ひび割れ）部位
 - (3) かさぶたの様に皮膚がはがれているところ
 - (4) 炎症部位（ただれ・赤くはれているところ）

■ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人
 - (3) 薬や化粧品等によりアレルギー症状（発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等）を起こしたことがある人
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この添付文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。
 - (1) 使用后、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、刺激感(いたみ、熱感、ぴりぴり感)、はれ、かさぶたの様に皮膚がはがれる状態

- (2) 2週間使用しても症状がよくならない場合

【効能・効果】

かゆみを伴う乾燥性皮膚（老人・成人の乾皮症）

【用法・用量】 1日1～数回、適量を患部に塗布する。

用法・用量に関連する注意

- (1) 用法・用量を守ってください。
- (2) 目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (3) 小児（15歳未満）には使用させないでください。
- (4) 外用にのみ使用してください。
- (5) 化粧品ではないので、効能・効果で定められた患部のみに使用し、基礎化粧品等の目的で顔面には使用しないでください。

【成分・分量】

1g中

成分	含量	はたらき
尿素	200mg	保湿成分。カサカサ肌に水分をとりこみ、しっとりやわらかくします。
リドカイン	20mg	かゆみの刺激が伝わるのをブロックすることで、かゆみをおさえます。
ジフェンヒドรามイン	10mg	抗ヒスタミン作用により、かゆみをおさえます。
グリチルレチン酸	3mg	皮ふの炎症をおさえます。
トコフェロール酢酸エステル	5mg	血行を良くして皮ふの新陳代謝を高めます。

添加物としてミリスチン酸イソプロピル、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、1-メントール、カルボキシビニルポリマー、グリセリン、ゲラニオール変性アルコール（99vol%）、水酸化Na、スクワラン、白色ワセリン、その他3成分を含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 本剤のついた手で、目など粘膜に触れないでください。
- (2) 高温をさげ、直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (3) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (4) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります。）
- (5) 使用期限（外箱及び容器に記載）をすぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後は品質保持の点からなるべく早く使用してください。

【包装】

100g

本商品についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局・薬店、又は下記の当社「お客様相談窓口」までお願い申し上げます。

祐徳薬品工業株式会社 お客様相談窓口

電話：0954-63-1320

受付時間：9:00～17:00（土、日、祝日は除く）

製造販売元  祐徳薬品工業株式会社

佐賀県鹿島市大字納富分 2596 番地 1