

使用に際しては、この添付文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるように保管してください。

## 鎮痛消炎薬

# 近江兄弟社メンタームQ軟膏 第3類医薬品

- ◆筋肉痛や神経痛などにさわやかな効きめのマッサージ薬。
- ◆**メンタームQ**軟膏には、浸透性をもった消炎鎮痛成分「サリチル酸メチル」が含まれ、皮下の血管に浸透して、痛みをしずめます。また、清涼感があり、局所を刺激し、知覚を鈍麻させて痛みやかゆみをやわらげる成分「l-メントール」も含まれています。
- ◆さわやかなにおいのある親水性の白色軟膏ですから、べとついたり衣服をよごすことは少なく、また、使用していることが外部からわかりません。



### 【使用上の注意】



#### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)  
次の部分には使用しないでください。

- (1) 目の周囲、粘膜等。
- (2) 湿疹、かぶれ、傷口。



#### 相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください。
  - (1) 医師の治療を受けている人。
  - (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
  - (3) 薬や化粧品等によるアレルギー症状(例えば発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人。
  - (4) 湿潤やただれのひどい人。
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。
  - (1) 使用後、次の症状があらわれた場合

| 関係部位 | 症 状        |
|------|------------|
| 皮 膚  | 発疹・発赤、かゆみ等 |

- (2) 5～6日間使用しても症状の改善がみられない場合

### 【効能・効果】

ロイマチス性疼痛、神経痛、関節炎、打撲筋肉痛、くじき、ねんざ、肩のこり、腰痛、歯痛、胸痛、鎮痒、扁桃腺炎、乳腺炎、頭痛、筋肉痛

### 【用法・用量】

コリや痛みを感じる部分に、適宜量を塗擦してください。

### ＜用法及び用量に関連する注意＞

- (1) 定められた用法を守ってください。
- (2) 目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (3) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (4) 本剤は外用にのみ使用してください。
- (5) お風呂上がりのご使用は一層効果的ですが、やや刺激が強くなりますのでご注意ください。

### 【成分・分量】

| 成 分      | 分 量  | はたらき                        |
|----------|------|-----------------------------|
| サリチル酸メチル | 12%  | 筋肉・関節などの痛みや“こり”による痛みをしずめます。 |
| l-メントール  | 6%   | 痛みやかゆみをやわらげます。              |
| ユーカリ油    | 2%   | 刺激して、疼痛や血液循環に有効にはたります。      |
| テレピン油    | 1.5% |                             |

添加物として、精製ラノリン、ステアリルアルコール、流動パラフィン、ステアリン酸、トリエタノールアミン、プロピレングリコール、カルメロースナトリウム、香料、シリコン油を含有する。

### 【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 高温・直射日光をさけ、なるべく湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 誤用をさけ、品質を保持するために、他の容器に入れかえないでください。

### 【包 装】

65gチューブ入・430gポリ容器入

## 《 お問い合わせ先 》

株式会社 近江兄弟社 お客様相談室

TEL. 0748-32-3135

受付時間:午前8:30から午後5:30まで(土・日・祝日を除く)

製造販売元 株式会社 近江兄弟社 滋賀県近江八幡市魚屋町元29