

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

日本標準商品分類番号 87226

第3類医薬品

うがい薬

副作用被害救済制度
電話：0120-149-931

ポリヨードン・ガーグル

POLYIODINE GARGLE


貯 法：直射日光を避け、室温保存
使用期限：3年。容器等に最終年月表示

- 【特徴】**
- ポリヨードン・ガーグルは、ポビドンヨードを有効成分とするうがい薬です。
 - 有効成分ポビドンヨードが、ヨウ素を遊離し、各種の細菌、真菌、ウイルス等広範囲の微生物に対して迅速な殺菌・消毒効果を発揮します。
 - ポリヨードン・ガーグルは殺菌消毒効果とうがいによる洗浄効果により、口腔内及びのどの殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去に優れた効果を発揮します。

ポリヨードン・ガーグルうがい薬はこのようにご使用ください。

うがいは1日数回行ってください。1回分のうがい液は、次のようにうすめて作ってください。

うすめ方



- キャップを開けて、うがい薬がはねたり、こぼれないように、注ぎ口をそなえつけのコップに入れます。
- 容器側面をゆっくり押し、コップを傾けて刻んだ目盛り（下の目盛りは2 mL、上の目盛りは4 mL）に合わせて、2~4 mLのうがい薬を入れます。
- ④ うがい薬を入れたコップを水平にもどし、はねたり、こぼれないように、上部に刻んである水平の線まで水を入れてうすめてください。約60 mLになります。

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります）
次の人は使用しないでください。
本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。

🏠 相談すること

- 次の人は使用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - 本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - 薬や化粧品等によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - 口の中のただれのひどい人。
 - 甲状腺の疾患のある人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は、副作用の可能性があるため、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
口	あれ、しみる、灼熱感、刺激感
消化器	吐き気
その他	不快感

まれに下記の重篤な症状が起きることがあります。
その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐ皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【成分・分量】 1 mL中 ポビドンヨード 70 mg（有効ヨウ素として7 mg）。
添加物として、エタノール、サッカリンナトリウム、香料を含有します。

<成分・分量に関連する注意>

本剤の使用により、銀を含有する歯科材料（義歯等）が変色することがあります。

【効能・効果】 口腔内及びのどの殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去

【用法・用量】 用時15~30倍（本剤2~4 mLを約60 mLの水）にうすめて、1日数回うがいしてください。

<用法・用量に関連する注意>

- 定められた用法・用量を守ること。
- 本剤はうがい用だけに使用し、キズややけどへの使用や、内服はしないでください。
- 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- 本剤は使用する時にうすめ、うすめた液は早めに使用してください。
- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。

【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 誤用を避け、品質を保持するため、他の容器に入れ替えないでください。
- 衣服等に付着すると着色しますので注意してください。万一、付着した場合には、すぐに水でよく洗い流してください。
- 使用期限が過ぎた製品は使用しないでください。

【包 装】 100 mL、250 mL、500 mL

【梱 包】 100 mL×20本入、250 mL×20本入、500 mL×10本入

【消費者相談窓口】 兼一薬品工業株式会社 医薬情報室 〒555-0033 大阪府大阪市西淀川区姫島3丁目5番23号
TEL 06(6471)3548 FAX 06(6471)5659

【製造販売元】 兼一薬品工業株式会社 〒555-0033 大阪府大阪市西淀川区姫島3丁目5番23号