

開け口

第Ⅱ類
医薬品

〈販売名〉近江兄弟社メンタームベンソールSP

【特長】

- しつこいかゆみ、はれ、赤みのもととなる炎症を抑えます。
- さされて炎症をおこした肌の修復を促進します。

【効能・効果】

- かゆみ ●虫さされ ●皮膚炎 ●湿疹 ●かぶれ ●ただれ
- じんましん ●あせも ●しもやか

【用法・用量】1日数回、患部に適量塗布してください。

〔用法・用量に記述する注意〕

- (1)キャップをとりはなし、スポンジ部分を肌に1~2回軽く押し当てて、スポンジに薬液をしみ込ませてからご使用ください。

- (2)足められの用法、用量を守ってください。
- (3)目に入らないよう注意してください。一目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗つください。なお、症状が重い場合は、眼科医の診査を受けてください。

- (4)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。

- (5)本剤は外用のみを使用してください。

【成分・分量】100mL中に次の成分を含みます。

成分	分量	働き
チキサメタゾン 酢酸エチル	0.025g	ぶりかえすかゆみやはれ、赤み等 のものになる炎症をおさえます。
ジフェニヒドリミン 塩酸塩	1.0g	虫さされ等に伴うかゆみを おさえます。
I-メントール	3.5g	清涼感を与え、かゆみをしめます。
dl-カボフル	1.0g	清涼感を与え、かゆみをしめます。
パンテーン	1.0g	はれ、赤みをおひた肌を修復 促進させます。
イソブロード メチルフェノール	0.1g	殺菌作用があります。

添付物として、エターナル、1,3-ブレンクリコール、ジブチルヒドロキシトルエンを含有する。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 使用後は必ずキャップを十分にしめてください。
- (2) 高温・直射日光を避け、涼しい所に密栓して保管してください。
- (3) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (4) 他の容器に入れかねないでください。(誤用の原因になつたり品質が変わります。)
- (5) 火気に近づいてください。
- (6) メガネ、時計、アクセサリー、プラスチック類、化粧製品、皮革製品、床や家具などの塗装面等に付着すると変質することがありますので、付着しないように注意してください。
- (7) 本剤のついた手で目等の粘膜にふれないでください。

▲(使用上の注意)一

☒ してはいけないこと

守らないと現在の症状が悪化したり、副作用がおこりやすくなります。

- 1. 次の部位には使用しないでください。

(1)水痘(水ぼうそう)、水虫、たむし等又は化膿している患部。

(2)創傷部、目の周囲部、粘膜等。

- 2. 長期連用しないでください。

3. 本剤はステロイド剤(副腎皮質ホルモン剤)テキサメタゾン酢酸エチルを含んでおり、顔面に広範囲又は長時間(2週間以上)塗布するとあらゆるようになりますことがありますので、顔面に続けて長く使用しないでください。

☒ 相談すること

- 1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください。

(1)医師の治療を受けている人。

(2)本人又は家族がアレルギー体質の人。

(3)薬や医薬品等によりアレルギー反応(例えば発疹・発赤・かゆみ・かぶれ等)を起しました。

(4)患部が広範囲の人。

(5)湿潤やただれのひどい人。

- 2. 次の場合、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師又は薬剤師に相談してください。

(1)使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位 症状

皮ふ 発疹・発赤、はれ、かゆみ

水虫・たむし等の白せん症、にきび、化膿症、持続的な刺激感、発疹

(2)5~6日間使用しても改善が見られない場合。

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/kenkouigai.html>

電話 0120-149-931