

ふくらはぎ
足裏・足指

急激な痛み
飲んで効く!

井藤漢方製薬

足・指のつり

こむらがえり [満量処方]

しゃく やく かん そう とう
芍薬甘草湯



ツリラック

(販売名) ツリラック



【効能】 体力にかかわらず使用でき、筋肉の急激なけいれんを伴う痛みのあるものの次の諸症：こむらがえり、筋肉のけいれん、腹痛、腰痛

第2類医薬品

※満量処方とは…

漢方処方より得られたエキスを
全量配合していることを意味します。

MADE IN JAPAN

✂ <キリトリ>

吸湿しやすいため、服用のつどチャックをしっかりと閉めること。 **漢方製剤**

⚠ 使用上の注意

⊗してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 心臓病の診断を受けた人は服用しないこと。 **2.** 症状があるときのみ服用にとどめ、連用しないこと。

🗨️相談すること **1.** 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。(1)医師の治療を受けている人(2)妊婦又は妊娠していると思われる人(3)高齢者(4)次の症状のある人:むくみ(5)次の診断を受けた人: 高血圧、腎臓病

2. 服用後、まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この袋を持って医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる
うっ血性心不全、心室頻拍	全身のだるさ、動悸、息切れ、胸部の不快感、胸が痛む、めまい、失神等があらわれる
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる

3. 5~6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

用法・用量 次の量を食前又は食間に水又は白湯で服用すること。

年 齢	1回量	服用回数
成人(15才~)	4錠	1日3回
15才未満	× (服用しないこと)	

※食間とは…食後2~3時間のことです。

<用法・用量に関連する注意>

●用法・用量を厳守すること。

成分 1日量(12錠)中 芍薬甘草湯エキス2400mg (シャクヤク6g、カンゾウ6gより抽出)
添加物として、セルロース、メタケイ酸アルミン酸Mg、カルメロースCa、ステアリン酸Mg、無水ケイ酸、ヒプロメロース、マクロゴール6000、カルナウバロウを含有する。

保管及び取り扱い上の注意 (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。(2)小児の手の届かない所に保管すること。(3)他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)(4)ぬれた手で触れないこと。(湿気により変色する場合がある。)(5)使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。なお、使用期限内であっても、袋開封後は早めに使用すること。

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

井藤漢方製薬株式会社

〒577-0012 大阪府東大阪市長田東2-4-1

お客様相談室

☎ 06-6743-3033 10:00~17:00(土日祝を除く)

101010002 5820048-1-UT206