

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

第3類医薬品

外皮用殺菌消毒剤

逆性石けん液

# ベンザルコニウム塩化物液10% (カネイチ)

(日本薬局方 ベンザルコニウム塩化物液)

BENZALKONIUM CHLORIDE SOLUTION 10% (KANEICHI)

貯法：気密容器  
室温保存  
使用期限：3年  
(容器等に表示)

**【特徴】** ベンザルコニウム塩化物液10% (カネイチ) は、日本薬局方ベンザルコニウム塩化物10w/v%を有効成分とする、一般に逆性石けんとも呼ばれている外皮用殺菌消毒剤です。

●使用する際に水で希釈して使用します。●一般細菌・真菌類に抗菌作用を示します。●使用出来る用途が幅広く、手指の殺菌・消毒をはじめ、創傷面・口腔内の殺菌・消毒から理容室・美容室での消毒や食器・器具類、家屋・乗物等、ゴミ箱・冷蔵庫等、幅広い箇所の消毒に使用できます。●水害時などの環境面の消毒にも使用できます。

## ⚠ 使用上の注意



### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

- (1) 原液のまま使用しないこと。
- (2) 患部に軽く塗るだけにとどめ、ガーゼ、脱脂綿等に浸して貼付しないこと。



### 相談すること

#### 1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 今までに薬や化粧品等によるアレルギー症状（例えば発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等）を起こしたことがある人。
- (2) 創傷面が広範囲の人あるいは深い傷やひどいやけどの人。
- (3) 医師の治療を受けている人。

#### 2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師に相談すること

本剤の使用により、皮ふに発疹・発赤、はれ、かゆみ等の症状があらわれた場合。

■効能・効果 手指の殺菌・消毒、創傷面の殺菌・消毒、口腔内の殺菌・消毒

■用法・用量 本剤を次のように水で希釈して、塗布または洗浄する。

- (1) 手指の殺菌・消毒・・・ベンザルコニウム塩化物として0.05～0.1%（本剤の100～200倍希釈液）
- (2) 創傷面の殺菌・消毒・・・ベンザルコニウム塩化物として0.01～0.025%（本剤の400～1,000倍希釈液）
- (3) うがいの場合・・・ベンザルコニウム塩化物として0.005～0.01%（本剤の1,000～2,000倍希釈液）

<用法・用量に関する注意>

- (1) 定められた用法、用量を守ること。
- (2) 原液又は濃厚液が皮膚に付着した場合は、炎症を起こすことがあるので、すぐに水で洗い流すこと。
- (3) 石けん類は本剤の殺菌作用を弱めるので、石けん分を洗い流してから使用すること。
- (4) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。
- (5) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (6) 外用にのみ使用し、内服しないこと。
- (7) 食品に直接触れる機械・器具等に使用する場合には、本剤が残らないように十分に水洗すること。

■成分・分量 100 mL中、ベンザルコニウム塩化物1.0g含有（10w/v%）。

<成分・分量に関する注意>

- (1) 皮革製品に付着した場合は、変質させることがあるので注意すること。
- (2) 染色した布は退色することがあるので注意すること。

■保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光を避け、なるべく涼しい所に密栓して保管すること。
- (2) 小児の手の届かないところに保管すること。
- (3) 誤用を避け、品質を保持するため、他の容器に入れ替えないこと。
- (4) 使用期限が過ぎた製品は使用しないこと。

その他の公衆衛生・家庭衛生分野での使用法

必ず薄めて使用してください。

対 象		希釈倍率 (濃度)	使用法
1) 理容室、美容 室での消毒	バリカン、ハサミ、 櫛、ブラシ、カミ ソリ等	100 倍 (0.1%)	石けんで十分に油分を除き、石けん分が残らないように水 洗した後、本剤の希釈液に 10 分以上浸す。金属器具を 長時間浸漬する必要がある場合は、腐食を防止するため 0.5～1%の亜硝酸ナトリウムを添加すること。
2) 食器、器具類 の消毒	茶碗、皿、コップ、 まな板、包丁類、 調理器具類等	200～ 500 倍 (0.05～ 0.2%)	食器・器具類を水洗いした後、本剤の希釈液に 5 分以上 浸漬した後、十分に水洗いする。または、本剤の希釈液を 布片で塗布・清拭するか、噴霧した後、十分に水洗いする。
3) 家屋、乗物等 の消毒	床、家具、手洗場、 浴槽、トイレ、座 席、手すり、看護・ 介護器具類等		本剤の希釈液を布片で塗布・清拭するか、噴霧する。また は、器具類を水洗いした後、本剤の希釈液に 5 分以上浸 漬する。
4) その他の消毒	ゴミ箱、冷凍・ 冷蔵庫等	100～ 200 倍 (0.05～ 0.1%)	本剤の希釈液を噴霧する。

■包装 100mL、500mL

■梱包 100mL×10 本入、500mL×20 本入

■副作用被害救済制度の問合せ先

(独) 医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

■消費者相談窓口

兼一薬品工業株式会社 医薬情報室 〒555-0033 大阪府大阪市西淀川区姫島 3 丁目 5 番 23 号

TEL 06(6471)3548 FAX 06(6471)5659

■製造販売元

兼一薬品工業株式会社

〒555-0033 大阪府大阪市西淀川区姫島 3 丁目 5 番 23 号