

スキネート

殺菌消毒剤

本剤の使用前に、この説明事項を必ずお読みください。



使用上の注意

相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談すること
 - 1) 医師の治療を受けている人
 - 2) 本人又は家族がアレルギー体質の人
 - 3) 今までに薬や化粧品等によるアレルギー症状を起こしたことがある人
 - 4) 患部が広範囲の人
 - 5) 深い傷やひどいやけどの人
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師に相談すること
 - 1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 ふ	発疹・発赤、かゆみ、はれ
 - 2) 5~6日間使用しても症状がよくならない場合

成分・分量

本品 100 mL 中	
日局 ジブカイン塩酸塩	100 mg
日局 ナファゾリン塩酸塩	100 mg
日局 クロルフェニラミンマレイン酸塩	200 mg
日局 ベンザルコニウム塩化物	100 mg

保管及び取扱い上の注意

- 1) 直射日光をさけ、なるべく湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること
- 2) 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないこと
- 3) 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと
- 4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと

効能・効果

切傷、すり傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の殺菌・消毒、痔疾の場合の肛門の殺菌・消毒

用法・用量

1日数回、患部に噴霧又はガーゼ、脱脂綿に浸して塗布する。

（用法・用量に関する注意）

- 1) 定められた用法、用量を厳守すること
- 2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること
- 3) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科専門医の診療を受けること
- 4) 外用にのみ使用し、内服しないこと

【包装】 80 mL

◎スキネート容器の使い方◎

キャップをはずし、患部に向けてノズルを押すと薬液が霧状に出ます。患部の周囲も洗い流す様に数回噴霧してください。

K08-FL



製造販売元
大洋製薬株式会社
東京都文京区本郷 3-14-16

大洋製薬お客様相談窓口
0120-184328
受付時間 午前10時~午後5時(土・日曜、祝日は除く)

副作用被害救済制度
0120-149-931