


この説明書は、本剤とともに
保管し、服用の際には、よくお読みください。


シュガーレス〈クールレモン味〉

鎮咳去痰薬

浅田飴せきどめCL

第2類医薬品

【ご使用上の注意】

してはいけないこと 

〔守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。〕
本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください。
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬（鼻炎用内服薬、
乗物酔い薬、アレルギー用薬）、鎮静薬

相談すること 

■ 1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師にご相談ください。

(1) 医師の治療を受けている人 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人 (3) 授乳中の人 (4) 高齢者 (5) 本人又は家族がアレルギー体質の人 (6) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人 (7) 次の症状のある人 高熱 (8) 次の診断を受けた人 心臓病、高血圧、糖尿病、甲状腺機能障害

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師にご相談ください。

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい

(2) 5～6回服用しても症状がよくならない場合

【効能・効果】

せき、ぜんそく、たん、のどの
炎症による声がれ・のどのあれ・のどの
不快感・のどの痛み・のどのはれ

【用法・用量】

次の量を口中に含み、かまずにゆっくり溶かして服用してください。服用間隔は2時間以上おいてください。

年 齢	1回量	服用回数
11才以上	2錠	1日6回
5才以上11才未満	1錠	
5才未満	服用しないこと	

- 定められた用法、用量を厳守してください。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

【成分・分量】12錠中

dl-メチルエフェドリン塩酸塩…37.5mg クレゾールスルホン酸カリウム…135mg
セチルピリジニウム塩化物水和物…3mg

添加物として還元水アメ、還元麦芽糖水アメ、グリチルリチン酸2K、アセスルファミンK、DL-リンゴ酸、
レモン油、アラビアゴム、カルナウバロウ、カラメル、L-メントール、タルク、サラシミツロウ、香料含有

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所にフタをしっかりと閉めて保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変化します。)
- (4) 5才未満の乳幼児の場合には、のどにつかえるおそれがありますので服用をさけてください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

- 副作用救済制度は、医薬品を正しく使用したにもかかわらず、入院を必要とする程度の副作用が生じた場合に医療費等の救済給付が行われる制度です。

製造販売元

 株式会社 浅田飴

東京都東村山市久米川町5-29-7

お問合せ先 03-3953-4044

1108◎3