

第2類医薬品

この添付文書は、本剤の使用前に必ずお読みください。
なお、必要な時に読めるよう、大切に保管してください。

化膿性皮膚疾患用薬

MEDICARE®

メディケア®シリーズ

とびひ、めんちょう、毛のう炎に

【販売名】 **オノフェF**

非ステロイド しみない軟膏タイプ

こどもにも
使える

3つの有効成分が、
とびひ、化膿した **ジュク皮膚炎**
に効く!

スルファジアジン 酸化亜鉛 アラントイン



●とびひとは…

細菌が原因で起こる皮膚の感染症。患部が赤くなり、かゆみを伴い、周囲に水疱ができます。また、つぶすと症状が広がります。とびひになりそうな患部は定期的な観察が必要です。とびひの初期症状を見つけ、効果的な治療をしましょう。

●めんちょう・毛のう炎とは…

細菌が原因で起こる毛穴の感染症。黄色い膿を持ち、周囲が赤く腫れます。顔にできるものを特にめんちょうといいます。

●オノフェFは

オノフェFは、とびひ・化膿の原因菌をスルファジアジンが殺菌し、酸化亜鉛がじゅくじゅくした炎症をおさえ、アラントインが組織の生成を促し、治りを早める軟膏タイプの医薬品です。皮膚は外部の細菌や刺激から私たちの身体を守っていますが、肌にトラブル(かき傷、すり傷、きり傷、湿疹、かぶれなど)が起こっている状態では細菌に感染し化膿しやすくなります。感染や化膿を防ぐためにも、患部を清潔に保ち、さわったり無理やりウミを出すことは避け、早めに治療しましょう。

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (3) 患部が広範囲の人
 - (4) 湿潤やただれのひどい人
 - (5) 深い傷やひどいやけどの人

(裏面もお読みください)

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるの
で、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録
販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、
この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能・効果

化膿性皮膚疾患(とびひ、めんちょう、毛のう炎)

用法・用量


1日数回、適量を患部に塗布するか、又はガーゼ等に延ばして貼ってく
ださい。

【用法・用量に関連する注意】

- (1)定められた用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させ
てください。
- (3)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、
すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、
眼科医の診療を受けてください。
- (4)外用にのみ使用してください。

【チューブの穴の開け方】

キャップを逆さにして、突起部をチューブの
先に強く押し当ててください。



成分・分量

(100g中)

成分	含量	はたらき
スルファジアジン	5.0g	殺菌作用により、患部の化膿を防ぎます。
酸化亜鉛	5.0g	患部の炎症をおさえ、痛みをしずめます。
アラントイン	0.5g	肉芽形成作用により、新しい組織の生成を 促進させます。

添加物として、d-ボルネオール、マクロゴール、ラノリン、ワセリンを
含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して
ください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質
が変わることがあります。)
- (4)使用期限の過ぎた製品は使用しないでください。

本品のお問い合わせは、お買い求めのお店、または
次のところにお問い合わせください。
森下仁丹株式会社(お問合せ先) ☎0120-181-109
受付時間 平日9:00~21:00(土、日、祝日9:00~17:00)

発売元 **森下仁丹株式会社**
大阪市中央区玉造1丁目2番40号

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(独)医薬品医療機器総合機構 ☎0120-149-931
<https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai/camp/index.html>

製造 **万協製薬株式会社**
販売元 三重県多気郡多気町五桂1169-142