

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

生薬配合の
便秘治療薬

新ドクソウガンG

第2類医薬品

新ドクソウガンGは、すぐれた効果が認められているセンノシドを主成分とし、さらに日本薬局方の規格に適合する4種類の生薬を配合した穏やかな錠剤の便秘治療薬です。それぞれの作用がひとつになって、便秘や便秘に伴う症状を改善します。5歳のお子様からお年寄りの方まで症状に合わせて服用量を調節できます。

使用上の注意



してはいけないこと



- 守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。
1. 本剤を服用している間は、他の瀉下薬（下剤）を服用しないで下さい。
 2. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けて下さい。
 3. 大量に服用しないで下さい。

相談すること



1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談して下さい。
 - (1)医師の治療を受けている人。
 - (2)妊婦又は妊娠していると思われる婦人。
 - (3)本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - (4)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (5)はげしい腹痛、悪心・嘔吐のある人。
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談して下さい。
 - (1)服用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	はげしい腹痛、悪心・嘔吐

- (2)1週間位服用しても症状がよくなる場合。
3. 下痢の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強がみられた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談して下さい。

効能・効果

- 便秘
- 便秘に伴う次の症状の緩和：吹出物、肌あれ、食欲不振（食欲減退）、腹部膨満、腸内異常醗酵、痔、のぼせ、頭重。

用法・用量

15歳以上	1回	3～6錠
11歳以上15歳未満	1回	2～4錠
7歳以上11歳未満	1回	2～3錠
5歳以上 7歳未満	1回	1～2錠

1日2回朝夕の空腹時又は食前あるいは食間に服用して下さい。

ただし、初回は最小量を用い、便通の具合や状態をみながら少しずつ増量又は減量して下さい。

- (1)用法・用量を厳守して下さい。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。

成分と働き 1日量・12錠中

成分	分量	働き	科名	薬用部分
センノシド (センノシドA・Bとして)	70mg (27.5mg)	センナから抽出・精製された成分で、緩下作用により、大腸の働きを活発にして自然なお通じを促します。	センナとして マメ科	葉
日局サンキライ末 山帰来	800mg	皮膚疾患の排膿・解毒作用により、吹出物・肌あれを抑えます。	ユリ科	根茎
日局コウボク末 厚朴	400mg	胃や腸の働きをよくする作用があり、食欲不振・腹部膨満・腸内異常醗酵に効果があります。	モクレン科	樹皮
日局カンゾウ末 甘草	500mg	鎮痛緩和作用により、お腹の痛みや痔等の不快感を抑えます。	マメ科	根
日局センキュウ末 川芎	500mg	補血作用により、血液の循環をよくし、のぼせ・頭重をやわらげます。	セリ科	根茎

添加物として結晶セルロース、乳糖、軽質無水ケイ酸、タルクを含有します。

〈成分及び分量に関連する注意〉

本剤の服用により、尿が着色（黄褐色～赤褐色）することがありますが、これはセンノシドによるものですから心配ありません。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光をさけ、湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- (2)小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3)誤用の原因になったり品質が変わることがありますので、他の容器に入れ替えないで下さい。
- (4)生薬を原料としていますので、製品の色や味等が多少異なることがあります。
- (5)使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

※姉妹品として

服用量を、きめ細かく調節できる生薬の小さな丸剤「**複方毒掃丸**」
服用し易い、成人用（15歳以上）の植物性の錠剤「**ドクソウガンE便秘薬**」
携帯に便利なPTP包装で、成人用（15歳以上）の糖衣錠「**ドクソウガンミニ**」
がございますので是非お試しください。

製造販売元

本 社

お客様相談係

ホームページ



〒277-0863 千葉県柏市豊四季73番地1

〒103-0027 東京都中央区日本橋2丁目1番3号

電話 04-7148-3412 代表

受付時間：9:00～16:30（土、日、祝日を除く）

http://www.dokusogan.jp