


哺乳びん・乳首の消毒、
医療器具等の消毒に

商品番号
KL29

Bean Stalk



ませるな
危険

● 酸性の洗浄・漂白剤、シア
ヌール酸系の製品と混合
すると爆発ガスが発生して
危険ですのでおやめください。

987493010012



哺乳びん・乳首・医療器具等消毒用

ピュリファン®P

500mL

医薬品

キャップ：PP
ボトル：PE
ラベル：PS



使用上の注意（使用前に必ずお読みください）

相談すること 次の場合は、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師に相談すること

使用後、次の症状があらわれた場合

| 関係部位 | 症状 |
|------|--------------|
| 皮ふ | あれ、発疹・発赤、かゆみ |

（効能効果）（用法用量）

| 効能効果 | 用法用量 |
|-------------|------------------------------------|
| 哺乳びん・乳首の消毒 | 哺乳びん・乳首を洗浄、水洗いした後、本剤の80倍液に1時間以上浸す。 |
| 医療器具の消毒 | 本剤の20～50倍液に数分間浸すか、清拭する。 |
| 器具・物品などの消毒 | 本剤の20～50倍液に数分間浸すか、清拭する。 |
| 室内・便所・浴室の消毒 | 本剤の20～50倍液で清拭する。 |
| 排泄物の消毒 | 本剤の1～10倍液を用いる。 |

（用法用量に留意すること）

●用法用量を遵守すること。（無理での稀釈は避けること。）●目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。●酸性の洗浄・漂白剤、シアルアル酸系の殺虫剤等との混合は危険なので避けること。●金属属性の容器は、変色があるので、用いないこと。また、哺乳びん・バサミ・スプーン等の金属製品や指輪等を消毒液につけることも避けること。●罐詰製、消毒液が変色した場合は、水質が本剤には不適当なので、その水での本剤の使用を避けること。●化学繊維、皮革、毛、綿製品への使用を避けること。●あやまって飲みこんだ場合は、すぐに水・生卵・ミルク等を飲み、医師に相談すること。

（成分分量）次塗堿鋼ナトリウム 1%

（成分に留意する注意）消毒する製品によっては印刷面、材質等を変色（変質）する場合があるので注意すること。
（保管及び取扱い上の注意）

●直射日光の当たらない涼しい所に貯蔵して保管すること。●小児の手の届かない所に保管すること。

●他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）

●衣類等につくと脱色、変色することがあるので注意すること。●使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。

（哺乳びん・ニブルの消毒方法）

●80倍液に1時間以上浸してください。（1L分を作る場合、本剤は12.5mLです。）

※本剤のキャップ1杯は約20mL、キャップ内側の目盛り線は約12.5mLです。

① 洗浄

授乳器すぐぐ、哺乳びんは洗剤を用いて洗ってから、充分にすすいでください。ニブルはもみ洗いで洗い、特に網目よりやすい死穢部はミルク残りがないよう専用の器具等で洗い、充分にすすいでください。



② 消毒液の準備

本剤を水道水で80倍に稀めます（4Lの場合は本剤50mL+キャップ2.5杯分）。

（例）



③ 滅菌

よく洗った哺乳びん・ニブルを滅菌液が残らないように完全に沈め、次の授乳まで1時間以上つけておきます。●滅菌液は24時間ごとに新しく作りなおしてください。



④ 哺乳

哺乳の前に哺乳びん・ニブルを清潔な手または専用ツングで取り出します。哺乳びん・ニブルは、くぼみ等に消毒液が残らないようよく裏り切ってご使用ください。（すぐ必要はありません。）においてが気になる場合は水道水ですすいでください。



販売元 ピーンスターク・スノー株式会社
東京都新宿区本郷14番地 0120-241-537

製造販売元 繁栄製薬株式会社
大阪市中央区伏見町2丁目6番8号

BeanStalk[®]は、大原製薬株式会社の商標です。