

この添付文書は服用前に必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。



便秘薬

第②類医薬品

腸草薬

便秘になると腹部膨満、頭痛、のぼせなどの不快な症状があらわれたり、また肌あれ、吹出物、痔などの原因になることがあります。

「腸草薬」は大腸のぜん動運動を促し、おだやかな便通をもたらす和漢生薬を主体とした緩下薬です。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないで下さい。
他の瀉下薬(下剤)
2. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けて下さい。
3. 大量に服用しないで下さい。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談して下さい。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (3) 本人又は家族がアレルギー体質の人
 - (4) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (5) 次の症状のある人
はげしい腹痛、悪心・嘔吐
 2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師又は薬剤師に相談して下さい。
 - (1) 服用後、次の症状があらわれた場合
- | 関係部位 | 症 状 |
|------|--------------|
| 皮 膚 | 発疹・発赤、かゆみ |
| 消化器 | はげしい腹痛、悪心・嘔吐 |
- (2) 1週間位服用しても症状がよくなる場合
3. 次の症状があらわれることがありますので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談して下さい。
下痢

効能・効果

- 便秘
- 便秘に伴う次の症状の緩和:
頭重、のぼせ、肌あれ、吹出物、食欲不振、腹部膨満、腸内異常発酵、痔

用法・用量

下記用量を一日一回就寝前に服用して下さい。

	2～3日便通がないとき	4日以上便通がないとき
大人(15歳以上)	2～3錠	4～5錠
11歳以上15歳未満	1～2錠	3～4錠
11歳未満	服用しないこと	

ただし、初回は最小量を用い、便通の具合や状態をみながら少しずつ増量又は減量してください。

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

〈成分・分量に関連する注意〉

- (1) 本剤の服用により、尿が橙色ないし赤色をおびることがあります。これは、本剤中のダイオウ末等によるもので心配ありません。
- (2) 本剤は、生薬を配合した製品ですから、製品により錠剤の色が多少異なることがあります。効果には変わりありません。

〈用法・用量に関する注意〉

錠剤の取り出し方

下図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用してください。

(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に
突き刺さる等思わぬ事故につながります。)



成分とはたらき

成分	分量 (5錠中)	はたらき
ダイオウ末	300mg	有効成分が腸の動きを活発にし、 排便を促します。
センナ末	500mg	
アロエ末	300mg	
ケイヒ末	90mg	胃腸機能を亢進し、食欲不振などを 改善します。
カンゾウエキス末 (カンゾウ350mgに相当)	50mg	ダイオウ末の働きを助けるとともに、 腸管内の水分を保持します。

添加物として、無水ケイ酸、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸Mg、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、マクロゴールを含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

お問い合わせ先

本剤についてのお問い合わせは、お買い求めの販売店又は下記までご連絡をいただきますようお願い申し上げます。

長野県製薬株式会社 お客様相談室

☎ 0120-100-975

受付時間:土・日・祝日及び弊社休業日を除く 午前9時～午後5時

発売元



長野県製薬株式会社

長野県木曾郡王滝村此の島100-1

製造販売元

国産薬品工業株式会社

岐阜市秋沢370-2