

ベンザルコニウム塩化物液

逆性石鹼コザカイ・P
(塩化ベンザルコニウム液)

Benzalkonium Chloride Solution

本剤の使用前に、この説明事項を必ずお読みください。



使用上の注意



してはいけないこと

[守らないと現在の症状が悪化したり副作用が起こりやすくなる]

1. 原液のまま使用しないこと。
2. 患部に軽く塗るだけにとどめ、ガーゼ、脱脂綿等に浸して貼付しないこと。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談すること。
 - (1) 今までに薬や化粧品等によるアレルギー症状、(例えば発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人。
 - (2) 患部が広範囲の人。
 - (3) 深い傷やひどいやけどの人。
 - (4) 医師の治療を受けている人。
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師に相談すること。

- (1) 使用后、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

- (2) 5～6日間使用しても症状がよくなる場合

効能・効果

- 手指の殺菌・消毒
- 創傷面の殺菌・消毒
- 口腔内の殺菌・消毒

用法・用量

本品を次のように水で希釈して、塗布または洗浄する。

- 手指の殺菌・消毒の場合：ベンザルコニウム塩化物として 0.05～0.1% (本剤の 100～200 倍液)
- 創傷面の殺菌・消毒の場合：ベンザルコニウム塩化物として 0.01～0.025% (本剤の 400～1,000 倍液)
- 含嗽の場合：ベンザルコニウム塩化物として 0.005～0.01% (本剤の 1,000～2,000 倍液)

〈希釈方法〉本剤のキャップは 1 杯は約 5 mL です。

100 倍液・・・本剤キャップ 2 杯を水 1 L に溶かす。

200 倍液・・・本剤キャップ 1 杯を水 1 L に溶かす。

〈用法・用量に関連する注意〉

1. 定められた用法・用量を守ること。
2. 原液又は濃厚液が皮膚に付着した場合は、炎症を起こすことがあるので、すぐ水で洗い流すこと。
3. 原液又は濃厚液が目に入らないように注意すること。
万一目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。

4. 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
5. 石けん類は本剤の殺菌作用を弱めるので、石けん分を洗い流してから使用すること。
6. 外用にのみ使用し、内服しないこと。

成 分

ベンザルコニウム塩化物 10^W/v% 水溶液

保管及び取扱い上の注意

1. 小児の手の届かない所に保管すること。
2. 直射日光をさけ、なるべく涼しい所に密栓して保管すること。
3. 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないこと。

その他

1. 皮革製品に付着した場合は、変質させることがあるので注意すること。
2. 染色した布地は退色することがあるので注意すること。

その他の公衆衛生・家庭衛生分野での使用法

1. 食器・器具類の消毒
茶碗、皿、コップ、ナイフ、包丁類、調理器具等は水洗いした後、本剤の 200～500 倍液に 5 分以上浸した後水洗いする。
2. 家屋、乗物等の消毒
床、畳、家具、調度品、手洗い場、浴槽、便所、座席、手すり、電話機等は本剤の 200～500 倍液で清拭するか又は噴霧する。
3. 塵芥箱、冷蔵庫の消毒
本剤の 100～200 倍液を噴霧する。
4. その他
食品工場、清涼飲料水工場、缶詰・製菓工場の施設、器具の消毒には本剤の 200～500 倍液を用いる。

【包装】 100 mL、500 mL



発売元
大洋製薬株式会社
東京都文京区本郷 3-14-16

製造販売元
小堀製薬株式会社
東京都墨田区両国 4-34-5

I08-FL

大洋製薬お客様相談窓口
☎0120-184328
受付時間 午前10時～午後5時(土日祝、祭日は除く)

副作用被害救済制度
☎0120-149-931