


使用前にこの説明書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう保管してください。

ものもらい・結膜炎の治療に 【ロート 抗菌目薬EX】

眼科用薬・10mL

第2類医薬品

小さなお子さまにも(1歳以上)



ものもらいは、身の回りにいる細菌がまぶたの脂腺などに入り込み、ハレや炎症を起こします。結膜炎は、細菌が結膜に感染して起こることが多く、白目が充血したり、目やにが多く出たりします。

目の表面にサルファ剤が長くとどまる製剤設計。

「ロート抗菌目薬EX」は、細菌に対して
強い抗菌力を持つサルファ剤を配合しています。

そして、このサルファ剤を目の表面に長くとどめる
粘稠剤ヒプロメロースを配合し、より高い抗菌効果を目指しました。

さらに、ビタミンE配合で、抵抗力の低下した目の血行を促し、

ものもらい・結膜炎の治療をサポートします。

ものもらい・結膜炎をしっかり治療したいときには

「ロート抗菌目薬EX」。



18世紀に、日本の医学の振興を目指して翻訳された「解体新書」。その開拓の思想のもとに、ロートは現代人の目の疾患をあらゆる方向から見つめ直しています。現在までに培ってきたノウハウと最新技術で酷使される目に応えたい、その想いを「解眼新書」の文字に託しました。

いつでも、どこでも、スムーズに点眼できる
フリーアングルノズル®



簡単にアイケアできて、とっても便利です。

ワンタッチ式スクリューキャップ



開ける時は左に1回カチッと回し、閉める時も
右に1回カチッと回すだけ。簡単便利です。

抗ヒスタミン作用を持つクロルフェニラミンマレイン酸塩配合で、目のかゆみを抑えます。

使用上の注意

してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

長期連用しないでください。

相談すること



1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (3) 次の症状のある人
はげしい目の痛み

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに

使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ、しみて痛い

3. 3～4日間使用しても症状がよくなり、
ない場合は使用を中止し、この説明書
を持って医師、薬剤師又は登録販売者
にご相談ください。

効能・効果

ものもらい、結膜炎（はやり目）、目のかゆみ、眼瞼炎（まぶたのただれ）

用法・用量

1回2～3滴、1日5～6回点眼してください。

用法・用量に関連する注意

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 容器の先を目やまぶた、まつ毛に触れさせないでください。
〔汚物や異物混入（目やにやホコリ等）の原因となる〕
また、混濁したものは使用しないでください。
- (3) ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- (4) 点眼用にのみ使用してください。



容器の先と
目やまつ毛が
ふれることのないように

有効成分

スルファメトキサゾールナトリウム…4.00% クロルフェニラミンマレイン酸塩……0.02%
グリチルリチン酸二カリウム………0.15% 酢酸d-α-トコフェロール（天然型ビタミンE）0.01%
添加物として、アミノカプロン酸、ホウ酸、ホウ砂、エデト酸Na、ヒプロメロース、ベンザルコニウム塩化物、ポリソルベート80、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール、pH調節剤を含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。品質を保持するため、過度の高温（自動車内や暖房器具の近く等）及び過度の低温（冷蔵庫の中等）を避け、なるべく涼しい所に保存してください。
- (2) キャップを閉める際は、カチッとするまで回して閉めてください。
- (3) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (4) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わる）
- (5) 他の人と共用しないでください。
- (6) 使用期限（外箱に記載）を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、一度開封した後は2～3ヶ月以内に使用ください。
- (7) 保存の状態によっては、成分の結晶が容器の先やキャップの内側につくことがあります。その場合には清潔なガーゼ等で軽くふきとってご使用ください。
- (8) 容器に他の物を入れて使用しないでください。



※点眼により口中に苦味を感じることがありますが、薬液が涙道を通して流れでてくるためで、無害ですから心配ありません。

お問い合わせ先:お客さま安心サポートデスク

この商品をお使いになってのご意見・ご要望、またご不満な点などをお聞かせいただけますか。「あなたに伝えたい」サポートデスクです。

東京:03-5442-6020 大阪:06-6758-1230

受付時間9:00～18:00(土、日、祝日を除く)



ロート製薬株式会社
大阪市生野区箕西1-8-1